

# The Poultry



# The Poultry





Prix is an "Animal Health" company dedicated to the development of Livestock and Poultry sectors of the country. The company strives to educate and assist farmers in keeping their flocks healthy and profitable. It stands out amongst its competition based on its industry leading quality and customer satisfaction. It is "making a difference" by ensuring strict adherence and compliance to the high standards it has set for itself. The company is GMP standard compliant and has ISO9002 quality certification.

The Management strongly believes in the education of people to promote a nationwide culture of industry best practices. To this end, development and education of people, both company personnel and farmers, holds immense importance for the company. At the heart of the organization are well-trained professionals and progressive minds, painstakingly cultivated over the years. The

Management considers such a team of people indispensable to handling industry problems effectively.

The Company maintains a wide range of veterinary products: Antibiotics; Anthelmintics; Anti-Coccidials and Anti-Protozoals; Anti-Inflammatories; Analgesics and Cortico Steroids; Metabolics, Vitamins and Minerals including Neutraceuticals; and breeding synchronization products.

Good health is the ultimate goal of life shared by everyone. We at Prix believe that healthy animals are a vital source of human health and prosperity. We hope that your experiences as our customer reflect our core values of trust and customer focus.

# Index

## Antibiotics/ Antibacterials:-

### **Water Soluble Powder**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Chlortin 200 <i>Water Soluble Powder</i>       | 10 |
| Colis 500 <i>Water Soluble Powder</i>          |    |
| Cotrim 50 <i>Water Soluble Powder</i>          |    |
| ColiMac <i>Water Soluble Powder</i>            |    |
| Doxyben <i>Water Soluble Powder</i>            |    |
| Doximac-C <i>Water Soluble Powder</i>          |    |
| Doxystin <i>Water Soluble Powder</i>           |    |
| Erytac <i>Water Soluble Powder</i>             |    |
| Flo Neo <i>Water Soluble Powder</i>            |    |
| Macrodox <i>Water Soluble Powder</i>           |    |
| Mycochlor <i>Water Soluble Powder</i>          |    |
| NCC Mix <i>Water Soluble Powder</i>            |    |
| Neo 720 <i>Water Soluble Powder</i>            |    |
| Prichick Gard <i>Water Soluble Powder</i>      |    |
| Pridox 150 <i>Water Soluble Powder</i>         |    |
| Pri-Tiamutin 12.5% <i>Water Soluble Powder</i> |    |
| Tricid <i>Water Soluble Powder</i>             |    |
| Tylo-DoxiCol <i>Water Soluble Powder</i>       |    |
| T C Dox <i>Water Soluble Powder</i>            |    |
| Weal-Tylocolis <i>Water Soluble Powder</i>     |    |

### **Feed Premix (Oral Powder)**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Colitrax <i>Oral Powder</i>    | 36 |
| Lincopri 44 <i>Oral Powder</i> | 38 |

### **Liquid Range**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Colis 120 <i>Oral Liquid</i>    | 44 |
| Pri-En 20 <i>Oral Liquid</i>    | 40 |
| Prinor 20 <i>Oral Liquid</i>    |    |
| Pri-En Colis <i>Oral Liquid</i> | 61 |
| Pri-Tiamutin <i>Oral Liquid</i> |    |

**Penicillin/ Derivatives + Combination:-****Water Soluble Powder**

C-Mox Water Soluble Powder  
 Linocomox Plus Water Soluble Powder  
 Pri-Bacstin Water Soluble Powder  
 Pri-Lincomac Water Soluble Powder  
 Primox 50% Water Soluble Powder  
 Primox 70% Water Soluble Powder  
 Primox-Plus Water Soluble Powder  
 Wealmox-Plus Water Soluble Powder  
 Pribiotic Water Soluble Powder

**Anti-Pratozouls/ Anti-Coccidials:-****Water Soluble Powder**

Cap 600 Water Soluble Powder  
 Cox 30 Water Soluble Powder 90  
 Coprix Water Soluble Powder  
 Diasul-S Water Soluble Powder 96  
 Dicox Forte Water Soluble Powder 92  
 Pancox Water Soluble Powder 94

**Oral Liquid**

Cap 25% Oral Liquid 104  
 Zuril 2.5% Oral Liquid 106

**Endoparasitic/ Ectoparasitic:-****Water Soluble Powder**

Ectofon Water Soluble Powder 110

**Anthelmintics/ Anti Parastic/ Endoparasitic:-****Water Soluble Powder**

Primisol 15 Water Soluble Powder 116  
 Primisol 50 Water Soluble Powder 118  
 Zoben 20 Water Soluble Granular 120

**Oral Liquid**

Bencil all oral Drench  
 Piprex 51 Oral Solution  
 Pri-ox Oral drench

**Metabolites/ Vitamins/ Electrolyles, Liver Tonics  
 Nutritional Supplements:-****Water Soluble Powder**

Ceprix 300 Water Soluble Powder  
 Dairyphos Water Soluble Powder  
 Faraminovit Water Soluble Powder  
 Farvisol Plus Water Soluble Powder  
 Metavit Super Water Soluble Powder  
 Pri Adek Water Soluble Powder

**Oral Liquid**

Hepa-pri oral solution  
 Prion Oral re-hydrating solution  
 Pri-Tolevit + SE Oral Liquid  
 Toltas Plus Oral Liquid

**Analgesics/ Anti-pyretic/ Anti-inflammatory:-****Water Soluble Powder**


Gesix-C Water Soluble Powder 96

**Flusher/ Diuretics:-****Water Soluble Powder**

Filtrax Water Soluble Powder 102  
 Urix Water Soluble Powder 105

Poultry Vaccination Schedule

# Antibiotics/ Antibacterials



# Chlortin 200

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

Chlortetracycline Hydrochloride --- 200 mg

**Activity:-**

Chlortetracycline is broad spectrum antibiotic. it is bacteriostatic but in higher concentration it is bactericidal. it also has some antiviral activity too also use in feed as a growth promoter.

**Indications:-**

Chlortin 200 is effective in cases like Coryza, Sinusitis, Airsacculitis, CRD, Mycoplasmosis, Omphalitis, Synovitis, Fowl cholera, Enteritis, Infectious bronchitis, New castle disease and in stress conditions as adjuvant therapy. It also improves growth and FCR in poultry.

**Dosage & Administration:-** (in poultry of all ages via drinking water/ feed.)

**In water:-** 20-50 mg/ kg body weigh orally once.

**In Feed:-** 300-400 gm/ tonne fo feed.

**Day old chicks:-** 1 gm in 4 Liters of drinking water for 3 days.

**Preventive:-** 1 gm in 4 Liters of drinking water for 5-7 days.

**Curative:-** 1 gm in 2 Liters of drinking water for 5 days.

**Severity of disease:-** 1 gm in 1 Liters of drinking water for 5-7 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## کلورٹن 200

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر:

کلورٹینر اسائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ..... 200 ملی گرام

**دائرہ عمل:**

کلورٹینر اسائیکلین ایک وسیع الاثر اینٹی بائیوٹک ہے۔ جو بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتی ہے لیکن زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے۔ کلورٹینر اسائیکلین اینٹی وائرل اثر بھی رکھتی ہے اور اسے فیلڈ میں گروتھ پرموٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

**علامات:**

کلورٹن 200 کو رازہ، سائینوسائٹس، ایریکولائٹس، ہی آر ڈی، مائیکوپلازموسسز، اوم فیلائٹس، انڈائٹس، فاول کالر، نیوکسیل، برونکائٹس اور سٹریس کے دوران معاون علاج ثابت ہوتی ہے۔ یہ مرغیوں میں بطور گروتھ پرموٹر اور ایف سی آر میں بہتری کھینے۔

**خوراک و استعمال:** (ہر عمر کی مرغیوں میں بذریعہ پینے کا پانی اور فیلڈ)۔

ایک دن کا چوزہ:- پانی میں 20 سے 50 ملی گرام فی کلو گرام وزن کھینے دن میں ایک بار۔  
فیلڈ میں:- 300 سے 400 گرام فی ٹن فیلڈ میں۔

تحفظ کھینے:- 1 گرام 4 لیٹر پینے کے پانی میں 5 سے 7 دن متواتر۔

علاج کھینے:- 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن متواتر۔

بیماری کی شدت:- 1 گرام 1 لیٹر پینے کے پانی میں 5 سے 7 دن متواتر۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔



# Cotrim 50

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each gm contains:

Trimethoprim ----- 80.000 mg

Sulphadiazine sodium - 420.00 mg

**Indications:-**

Complicated CRD infections due to Haemophilus, E.coli, Salmonella, Pasteurella and Mycoplasma species. Also indicated for the infections of unknown origin + multiple infections.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:-** 30-50 mg/ kg body weight equivalent to 20-33 gm Cotrim 50 powder per 100 liters of drinking water 3-5 days.

**Treatment:-** 1 gm in 4 liters of drinking water 3~5 days.

**Prevention:-** 1 gm in 5 liters of drinking water 3~5 days.

**Non-ruminants animals:-** 1 gm per 16.5-33 kg body weight (15-30 mg/ kg) for 3 days mixed with water or milk replacer.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 10 days.

**Packing:-**

5 gm x50 Sachets,

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## کوٹرم 50

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر

ٹرائی میتھوپریم ..... 80.000 ملی گرام

سلفاڈایازین سوڈیم ..... 420.000 ملی گرام

**علامات:**

کوٹرم 50 کو رائو، سی آر ڈی، کوئی بیسی لوسسز، اینٹریوں کی سوزش، فائول کارلر، فائول نائیفائیڈ، پلورم، چھوٹے چوزوں میں شرح اموات، بیماری کی تشخیص نہ ہونا اور پیچیدہ انفیکشن کے خلاف بے حد مؤثر دوا ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بزرگ پینے کا پانی)۔

پولٹری: 30 سے 50 ملی گرام پاؤڈر فی 50 کلو گرام وزن کھلے مساوی 20 سے 33 ملی گرام کوٹرم 50 پاؤڈر فی 100 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

بیماری کا علاج: 1 گرام 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

بیماری سے تحفظ: 1 گرام 5 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

بچھڑے، بھیڑ، بکری: کوٹرم پاؤڈر 1 گرام 5.16 سے 33 کلو گرام وزن بحساب

(15 سے 30 ملی گرام فی کلو گرام) 3 روز متواتر دودھ یا متبادل دودھ میں ملا کر دیں۔

**ادویاتی احتیاط:**

انڈے اور گوشت 10 روز۔

**پیکنگ:**

5 گرام x 50 ساٹھے، 100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام

# ColiMac

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each gm contains;

Colistin Sulphate --- 25,00,000 IU

**Indication:-**

Colimac (Colistin) wsp is a polypeptide antibiotic highly effective against Gram -ve bacteria specially E.Coli and Salmonella spp. which develops resistant to many antibiotics, responsible for enteritis (diarrhoea), colibacillosis, salmonellosis. It has a very high security level due to its low toxicity by oral route.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:-** 1 gm per 5 Liters of drinking water for 3-5 days.

19500 IU eq. 1 mg (2-5 mg per kg) body weight.

(Medicated water should be used with in 24 hours).

1 gm per 50 kg live weight.

**Withdrawal Time:-**

Meat: 7 days, Eggs: 2 days.

**Packing:-**

100 gm, 250 gm, 500 gm, 1 Kg.



## کولی میک

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر

کولیسٹین سلفیٹ ..... 25,00,000 آئی یو

**علامات:**

کولی میک (کولسٹین) حل پذیر پاؤڈر ایک پولی پیپٹائیڈ گروپ کی اینٹی بائیوٹک ہے۔ جو خصوصاً گرام نیگٹیو بیکٹیریا، ای کولائی، سالمونلا اقسام کے خلاف نہایت مؤثر ہے۔ جہاں یہ بیکٹیریا دوسری اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مدافعت بنالیں جو انٹرائنس (ڈائیریا) کولی میسی لوسسز، سالمونیلوسسز کے لیے ذمہ دار ہوں۔ یہ ایک محفوظ اینٹی بائیوٹک ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: 1 گرام 5 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن گھنٹے۔

19500 آئی یو مساوی 1 ملی گرام (2-5 ملی گرام فی کلو گرام وزن) گھنٹے۔ یا

(دوا ملا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کریں۔)

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت 7 دن، انڈے: 2 دن۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 250 گرام، 500 گرام، 1 کلو گرام۔

# Colitrax

## Feed Premix Powder

**Composition:-** Each gm contains;

Colistin Sulphate — 80,000 IU

Zinc Bacitracin — 40,000 mg

### Activity:-

is polymim antibiotic with bactericidal action against Colistin Sulphate gram —ve bacteria like E-coli, salmonella etc.

Zinc Bacitracin active against gram +ve bacteria like syaphloococcus and streptococcus etc. it is mainly used as growth promoter & to cure bacterial diarrhea.

### Indications:-

Colitrax premix powder is synergetic combination of Colistin Sulphate and Zinc Bacitracin is indicated for the treatment and prevention of bacterial enteritis or necrotic caused by gram positive and gram negative bacteria including Clostridium spp, E-coli, Haemophilus, Salmonella spp etc.

**Dosages:-** (to be mixed in final feed.)

**Poultry (All ages):-** 50 — 100g Colitrax / 100 Kg of the Feed.

**Cattle (Calves):-** 50 — 200g Colitrax / 100 Kg of the Feed.

### Withdrawal Time:-

Meat, Egg: None

### Packing:-

1 kg, 5 kg, 25 kg.



# کولی ٹریکس

فیڈ پری میکس پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر

کولسٹین سلفٹ 80,000 آئی یو

زنک ٹیسٹر اسین 40,000 ملی گرام

## دائرہ عمل:

کولسٹین سلفٹ پولی میگلون اینٹی بائیوٹک ہے۔ جو کہ گرام نیگیو بیکیٹیریا (ای کولائی، سالمونیلہ) کے خلاف بیکٹیریڈل اثر کرتی ہے۔

زنک ٹیسٹر اسین گرام پازیٹیو بیکیٹیریا کے خلاف زود اثر ہے جیسا کہ سٹیفٹوکوکس، سٹریپٹوکوکس وغیرہ۔ اس کو گروتھ پروموتور کے طور پر اور ڈائریا کے علاج کے لئے۔

## علامات:

کولی ٹریکس پری میکس پاؤڈر کولسٹین سلفٹ اور زنک ٹیسٹر اسین کا سینیٹک مرکب ہے جو گرام پازیٹیو اور گرام نیگیو بیکیٹیریا کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن مثلاً بیکٹریل انٹراسٹس یا ٹیکروٹک جس کی وجہ سے کلاسٹریم اقسام، ای کولائی، ہیموفلس اور سالمونیلہ اقسام سے ہوتے ہیں۔

## خوراک و استعمال:

مرغیاں (ہر عمر): 50 سے 100 گرام کولی ٹریکس 100 کلو گرام تیار فیڈ میں۔

مویشی (کٹے): 50 سے 200 گرام کولی ٹریکس 100 کلو گرام تیار فیڈ میں۔

## ادویاتی احتیاط:

گوشت و انڈے: کوئی نہیں۔

## پیکنگ:

1 کلو گرام، 5 کلو گرام، 25 کلو گرام۔

# Doxyben

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm powder contains;

Tylosin Tartrate ----- 10 gm

Doxycycline Hyclate ---- 21 gm

**Indication:-**

Doxyben wsp. is indicated for the complex respiratory and Gastro-intestinal infections, O.R.T caused by Tylosin & Doxycycline sensitive organisms (Haemophilus, E-Coli, Salmonella, Pasteurella, Compylobacter, Staphalococcus, Streptococcus ornithino-bacterium species) in poultry.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry, other small animals:-** 1-2 gm per litre of DW. for 3-5 days.

Medicated water should be used within 24 hours.

**Withdrawal Time:-**

Meat (Poultry, turkey etc.): 6 days, Eggs: 4 days

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm



## ڈوکسی بین

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی 100 گرام پاؤڈر

ٹائیلوسین ٹارٹریٹ ..... 10 گرام

ڈوکسی سائیکلین ہائیڈرکلیٹ ..... 21 گرام

**علامات:-**

کمپلیکس ریپائریٹری، نظام انہضام کے انفیکشن اور آرٹی، جن کی وجہ سے ہیموفیلس، ای کولائی، سالمونیلہ، پارٹیویریا، کمپائیلوبیکٹر، سٹیفیلوکوکس، سٹریپٹوکوکس اور نی تھینو بیکٹریل کی اقسام، مرغیوں میں بیماری کا باعث بنتے ہیں اور ٹائیلوسین اور ڈوکسی سائیکلین کے دائرہ اثر میں آئیں۔

**خوراک و استعمال:-** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں اور چھوٹے جانور: 1 سے 2 گرام فی لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

(دوا ملا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کروائیں۔)

**ادویاتی احتیاط:-**

گوشت (مرغیاں اور ڈکیمز وغیرہ): 6 دن، انڈے: 4 دن

**پیکنگ:-**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Doximac-C

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains;

Colistin Sulphate ----- 25,00,000 IU

Tylosin (as tartrate) ----- 100 mg

Doxycycline (as hyclate) ----- 100 mg

Bromhexine (as Hydrochloride) ----- 5 mg

**Indication:-**

Doximac-C WSP can be used for the prevention and treatment of infectious gastrointestinal and respiratory diseases such as infectious coryza, CRD, CCRD, Staphylococcosis, Bacterial Enteritis, Fowl Cholera, Pneumonia-Enteritis, , caused by Gram +ve and Gram -ve Bacteria Haemophilus, Mycoplasma, E.Coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Pasteurella, Campylobacter and Bordetella species.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:** 1 gm per 2 Liters of drinking water for 3-5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat: 72 hours.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1kg.



## ڈوکسی میک سی

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر:

کولسٹین سلفیٹ ..... 25,00,000 آئی یو

ٹائیلوسین (بطور ٹارٹریٹ) ..... 100 ملی گرام

ڈوکسی سائیکلین (بطور ہائیڈرکلیٹ) ..... 100 ملی گرام

بروم ہیکسین (بطور ہائیڈروکلورائیڈ) ..... 5 ملی گرام

**علامات:-**

ڈوکسی میک سی حل پذیر پاؤڈر نظام انہدام اور نظام تنفس کی بیماریوں کی روک تھام اور علاج کھینچنے۔ متعدی کورائزہ، آئی آر ڈی، سی آر ڈی، سٹیفیلو کوسس، بیکٹیریل انٹرائٹس، فاول کالیر، نمونیا، انٹرائٹس جن کی وجہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو بیکٹیریا، ایس۔ ایف۔ ایس۔، مائیکوپلازما، ای۔ کولائی، سلمونیلہ، سٹیفیلو کوکس، ہسٹریکٹو کوکس، پائچوریا، کمپائیلوبیکٹر اور بورڈیٹلہ اقسام ہوں۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

**ادویاتی احتیاط:**

دودھ 6 گھنٹے، گوشت 72 گھنٹے۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1 کلو گرام۔

# Doxystin

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm contains;

Doxycycline (as hyclate) ----- 10 gm

Colistin Sulphate ----- 20 MIU

**Activity:-**

Doxycycline belongs to tetracycline group & acts bacteriostatic against gram +ve & gram -ve bacteria.

Colistin is polymixin with bactericidal action against gram -ve bacteria like E-coli, salmonella Haemophilus spp.

**Indication:-**

Doxystin is recommended for the control and treatment of Mycoplasma (CRD, CCRD), E-Coli, Salmonella, Haemophilus, Staphylococci and infectious synovitis in poultry.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:- Treatment:-** 1 gm per 2 Liters of drinking water for 3-5 days.

**Prevention:-** 1 gm per 4 Liters of drinking water for 3-5 days.

Medicated water should be used within 24 hours.

**Withdrawal Time:-**

7 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## ڈوکسی سٹین

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ڈوکسی سائیکلین ہائیڈرکلیٹ ..... 10 گرام

کولسٹین سلفٹ ..... 20 ایم یو۔

**دائرہ عمل:**

ڈوکسی سائیکلین ٹیٹراسائیکلین گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو کہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کو مار دیتی ہے۔ کولسٹین پولی میکزین اینٹی بائیوٹک ہے جو گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کے خلاف بیکٹیریسیڈل اثر رکھتی ہے۔

**علامات:**

ڈوکسی سٹین مرغیوں میں مائیکوپلازما (سی آر ڈی، سی سی آر ڈی)، ای کولائی، سالمونیا، کورائزہ، ٹائیفائیڈ کے لیے مؤثر دوا ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذر یعد پینے کا پانی)۔

مرغیاں: علاج: 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک روزانہ۔

تھک: 1 گرام 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک روزانہ۔

(دوا کا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کروائیں)۔

**ادویاتی احتیاط:**

7 دن۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Erytac

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

Erythromycin as Thiocyanate -- 60 mg.

Furaltadone as Hydrochloride - 150 mg.

Tylosin as Tartrate ----- 50 mg.

**Activity:-**

Erythromycin belongs to macrolide group. it is active against most G+ve & less against G- ve bacteria. it is bacteriostatic an low concentration & bactericidal in high concentration.

Furaltadone is nitrofurant antibiotic used for enteric & respiratory infections.

Tylosin also belongs to macrolide group use in CRD, infections sinvsitis, pneumonia etc in poultry.

**Indications:-**

Erytac wsp is indicated for the treatment of respiratory and gastrointestinal tract bacterial infections in poultry e.g. Infectious coryza, CRD, CCRD, Salmonellosis (Enteritis), Fowl typhoid, Fowl cholera, Synovitis, and to decrease the mortality rate in complex infections.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water or feed.)

**Poultry: chicks, broiler, layer, breeder, (All ages).**

**Prevention:** 1 gm in 2 liters of drinking water for 3~5 days.

**In feed:** 100 gm/ 50 kg feed bag.

**Treatment:** 1 gm in 1 liter of D.W. for 3~5 days.

**In feed:** 200 gm/ 100 kg feed.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.

## ایری ٹیک

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر

ازتھر و مائی سین (بٹور تھائیوسائی نیٹ) ..... 60 ملی گرام

فورٹالڈون (بٹور ہائیڈروکلورائیڈ) ..... 150 ملی گرام

ٹائیلوسین (بٹور ٹارٹریٹ) ..... 50 ملی گرام

**دائرہ عمل:-**

ازتھر و مائی سین کا تعلق میکرو لائیڈ گروپ سے ہے اس کا زیادہ اثر گرام پازٹیو بیکٹریز یا کے خلاف ہے۔ کم مقدار میں بیکٹیریوسٹیک ہے جب کہ زیادہ مقدار میں بیکٹیریسیڈل ہے۔ فورٹالڈون نائٹرو فوراں اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ انتڑیوں اور نظام تنفس کے انفیکشنز کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ٹائیلوسین کا تعلق بھی میکرو لائیڈ گروپ سے ہے۔ مرغیوں میں سی۔ آر۔ ڈی انفیکشن، سائینوسائٹس اور نمونیہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

**علامات:-**

ایری ٹیک پاؤڈر مرغیوں میں نظام تنفس اور نظام انہضام کے بیکٹریل انفیکشن مثلاً متھدی کورائزہ سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، سالمونیلا سسز (انٹرائس)، فاول ٹائیفائیڈ، فاول کالرو، سائینوسائٹس اور کمپلیکس انفیکشن میں شرح اموات کی کمی کے لئے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی و فیڈ)

مرغیاں (چوزے، براٹر، لیسر، بریڈر) ہر عمر:-

برائے تحفظ: 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 3 سے 5 روز۔

فیڈ میں: 100 گرام فی بیگ فیڈ (50 کلو گرام)

علاج کے لئے:- 1 گرام 1 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 3 سے 5 دن۔

فیڈ میں: 200 گرام 100 کلو گرام فیڈ میں۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔



# FloNeo

water soluble powder

**Composition:-** Each kg contains;  
Neomycin Sulfate ---- 285.9 gm

## Indication:-

For the treatment of diseases caused by gram negative bacteria susceptible to neomycin sulfate.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry, Turkeys, Ducks:-** 1 gm per 2-4 liters in DW. for 3-5 days.

**Cattle (calves), Horses (foals):-** 10 gm per 100 kg B.W. for 3-5 days.

**Sheep & Goats etc:-** 5 gm per 50 Kg body weight 3-5 days.

## Withdrawal Time:-

Meat 5 days.

## Packing:-

100 gm, 250 gm, 500 gm, 1 kg



# فلونیو

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی کلوگرام پاؤڈر

نیومائی سین سلفیٹ ..... 285.9 گرام

## علامات:-

گرام نیگٹیو بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے سد باب اور علاج کے لیے جو نیومائی سین سے حساس ہوں۔

**خوراک و استعمال:-** (بذر یوہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں، بڑکیز، بٹھیل: 1 گرام 2 سے 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

مویشی (بچھڑے) گھوڑے (بچھڑے): 10 گرام فی 100 کلوگرام وزن کھلنے 3 سے 5 دن۔

بھیر، بکری: 5 گرام فی 50 کلوگرام وزن کھلنے 3 سے 5 دن۔

## ادویاتی احتیاط:-

گوشت 5 دن۔

## پیکنگ:-

100 گرام، 250 گرام، 500 گرام، 1 کلوگرام۔

# Macrodox

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

Tylosin (Tartrate) ----- 200 mg.

Doxycycline (Hyclate) -- 250mg.

**Indications:-**

In pathogenic diseases caused by bacteria sensitive to doxycycline & tylosin, highly effective to use against Coryza, CRD, Coli-bacillosis, CCRD, Mycoplasmosis, synovitis, fowl cholera and ORT.

**Activity:-**

Tylosin:- belongs to macrolide group active against CRD, Coryza, colibacillosis, mycoplasma, synovitis etc.

Doxycycline:- belongs to tetracycline group acts as bacteriostatic against G +ve & G -ve bacteria.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:** 1 gm in 3-4 liters of drinking water for 3-5 days.

**Calves:** 500 gm for 400 calves of 50 kg for 3-5 days in drinking water or milk replacer.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## میکروڈوکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر

ٹائیلسین (ہیڈرو ٹارٹریٹ) ..... 200 ملی گرام

ڈوکسی سائیکلین (ہیڈرو بائی کلٹیٹ) ..... 250 ملی گرام

**علامات:-**

ڈوکسی سائیکلین اور ٹائیلسین سے "حساس بیکٹریا" اور پیدا ہونے والی جراثیمی بیماریاں خصوصاً کورائزہ، سی آر ڈی، کولی ٹیسی لوسسز، سی سی آر ڈی، مائیکوپلازموسسز، مائیکوڈائٹس، ٹائڈل کالرہ اور او آر ٹی کے خلاف نہایت مؤثر علاج ہے۔

**دائرہ عمل:-**

ٹائیلسین میکروڈوکس گروپ سے تعلق رکھتی ہے یہ سی آر ڈی، کورائزہ، کولی ٹیسی لوسسز، مائیکوپلازما، مائیکوسائٹس کے خلاف زوداثر ہے۔

ڈوکسی سائیکلین:- ٹیٹراسائیکلین گروپ سے تعلق رکھنے والی وسیع الاثر اینٹی بائیوٹک ہے جو گرام پائزٹیو اور گرام نیگٹیو بیکٹریا کے خلاف اثر کرتی ہے۔

**خوراک و استعمال:-** (بزرگ پینے کا پانی)۔

مرغیوں میں: 1 گرام 3 سے 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

بچھڑوں میں: 500 گرام پاؤڈر 50 کلو گرام وزن کے 400 بچھڑوں کے لئے

3 سے 5 روز پینے کے پانی میں یا ملک ریلیمر کے ساتھ۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Mycochlor

oral powder

**Composition:-** Each 100 gm oral powder contains;

Tiamulin Hydrogen Fumerate----- 10.000 gm

Chlortetracycline Hydrochloride---- 30.000 gm

**Indication:-**

Mycochlor is used for the treatment and prevention of a variety of bacterial infections including Coli Septicemia, Omphalitis, fowl Cholera, Enteritis, Infectious Coryza and Chronic Respiratory Disease, it is also helpful for the treatment and control of respiratory and enteric infections in calves, sheep and goat. Mycochlor improves FCR and weight gain and also increase egg production in layer and breeders.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water or feed)

**Poultry:**

**Treatment:** 1 gm per 2-3 Liters of D.W for 3-5 days continuously.

**Mix in Feed:** 3.3 kg per ton of feed for 3-5 days continuously.

**Prevention:** 1 gm per 3-4 Liters of D.W for 3-5 days continuously.

**For Egg Production:** 1 gm per 4-8 Liters of drinking water continuously 1 week in every month up to 52 weeks.

**Withdrawal Time:-**

Meat: 8 days.

**Packing:-**

100 gm, 250 gm, 500 gm, 1 kg, 5 kg.

## مائیکوکلور

اورل پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام

ٹيامولين ہائیڈروجن فیومیریت..... 10.000 گرام

کلورٹیراسائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ..... 30.000 گرام

**علامات:**

مائیکوکلور کوئی سٹیپٹیسما، اومفلایٹس، فاول کالرا، آنتوں کی سوزش، کورائیزہ اور سی آر ڈی سے بچاؤ اور علاج کے لیے مفید ہے۔ یہ وائرل، کوکسیڈل اور مائیکوپلازما انفیکشن کے بعد ہونے والی سیکنڈری انفیکشن سے بچاتا ہے۔ مائیکوکلور پچھروں، بھیر اور بکری میں نظام تنفس اور آنتوں کی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ مائیکوکلور ایف سی آر اور وزن میں بہتری لاتا ہے اور لیئر اور بریڈر میں انڈوں کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی یا فید)۔

**علاج:** 1 گرام 2 سے 3 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن روزانہ۔ یا

**خوراک میں:** 3.3 کلو گرام فی ٹن فید میں 3 سے 5 دن روزانہ۔

**بچاؤ:** 1 گرام 3 سے 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن روزانہ۔

انڈوں کی بہتر پیداوار کیلئے: 1 گرام 4 سے 8 لیٹر پینے کے پانی میں ہر مہینے ایک ہفتے کیلئے 52 ہفتوں تک۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت 8 دن

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام، 5 کلو گرام۔

# NCC Mix

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm Contains;

Neomycin Sulphate ----- 7 gm

Colistin Sulphate ----- 0.4 gm

Chlortetracycline Hcl ---- 8 gm

**Indications:-**

For combined antibacterial activity against gram positive/ gram negative bacteria. Caused for CRD (Stress) bacterial/ enteritis due to E-coli, Salmonella (enteritis) coli bacillosis, Fowl typhoid/ cholera, mycoplasmosis.

**Dosage & Administration:-** (oral use only)

**Mild condition:** 1 gm for 2 liters of water for 3 continuous days.

**Severe Conditions:** 1 gm for 1 liter of water for 3-5 days.

**Large Animals:** 1 gm per 15 kg body weight.

**Packing:-**

100 gm, 250 gm, 1 kg, 5 kg.



## این سی سی مکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی 100 گرام

نیومائی سین سلفیٹ ..... 7 گرام

کولسٹین سلفیٹ ..... 0.4 گرام

کلورٹیترا سائیکلین ایچ سی ایل ..... 8 گرام

**علامات:-**

مشترکہ اینٹی بیکٹریل عمل کیلئے گرام پازیو، گرام نیگیو بیکٹریا کے خلاف جو وجہ نہیں۔ سی آر ڈی (ایسٹریس) بیکٹریل انٹرایٹس، ای کولائی، سالمونیلہ کی وجہ سے سینکڑوں ایک انٹرایٹس، کوئی بیسی لوسسز، فاول کالرہ، فاول ٹائیفائیڈ، مائیکوپلازموسسز۔

**خوراک و استعمال:-** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

تحفظی خوراک 1 گرام پاؤڈر 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 روز مسلسل۔

معالجتی خوراک 1 گرام پاؤڈر 1 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

مویشیوں کیلئے: 1 گرام فی 15 کلو گرام جسمانی وزن کیلئے۔

**پیکنگ:-**

100 گرام، 250 گرام، 1 کلو، 5 کلو گرام۔

# Neo 720

water soluble powder

**Composition:-** Each gm powder contains;

Neomycin Sulfate ---- 720 mg.

**Indication:-**

For the treatment of diseases caused by gram negative bacteria susceptible to neomycin sulfate.

**Activity:-**

Neomycin:- belongs to aminoglycoside group active against most G -ve bacteria & some G +ve bacteria.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:-** 11 mg per kg body weight or 12.6 gm per 100 liters of drinking water (eq. 1 gm per 8 liters of drinking water) for 3-5 days.

Medicated water should be used within 24 hours.

**Cattle (calves), Horses (foals):-** 3 gm per 100 kg B.W. for 3-5 days.

**Sheep & Goats etc:-** 1 gm per 15 Kg body weight 3-4 days

**Withdrawal Time:-**

Meat : 5 days

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1 kg.



# نیو 720

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر

نیومائی سین سلفیٹ ..... 720 ملی گرام

**دائرہ عمل:-**

نیومائی سین امائیٹو کلائیکو سائیڈ گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو گرام نیگیٹو بیکٹیریا کے خلاف موثر ہے۔ کچھ گرام پازٹیو بیکٹیریا کے خلاف بھی۔

**علامات:-**

گرام نیگیٹو بیکٹیریل انفیکشنز جو نیومائی سین سے حساسیت رکھتے ہوں۔

**خوراک و استعمال:-** (بذر یو پینے کا پانی)۔

مرغیاں: 11 ملی گرام فی کلو گرام وزن کے لیے۔ یا

6.12 گرام فی 100 لیٹر (مادی 1 گرام فی 8 لیٹر) پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک۔

(دوا ملا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کریں)

مویشی (بچھوڑے) گھوڑے (بچھوڑے): 3 گرام فی 100 کلو گرام وزن کے لیے 3 سے 5 دن کے

لیے پلائیں۔

بھیر: بکری: 1 گرام فی 15 کلو گرام وزن کے لیے 3 سے 4 دن کے لیے پلائیں۔

**ادویاتی احتیاط:-**

گوشت 5 دن۔

**پیکنگ:-**

100 گرام، 500 گرام، 1 کلو گرام۔

# Pri-Chick Guard

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each 100 gm contains;

Sulfachloropyradazine ----- 10 gm.

Trimethoprim ----- 2 gm.

**Indications:-**

Pri Chick Guard is highly effective against to gram positive & Gram negative bacteria infections in poultry to treat bacterial stress chick mortality, coryza, airsac infection pullorum disease, CRD, coliform septicaemia and other sensitive bacteria caused diseases.

**Dosage & Administration:-** (Via drinking water or feed.)

200 mg / kg body weight. or

1-1.5 gm per litre of drinking water daily for 3-6 days.

Prepare solution of Pri-Chick Guard wsp by reducing the water tank to half of its volume. Dissolve the required quantity of dosing powder and properly fill it. The recommended dose of Pri Chick Guard is completely safe.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Egg: 4 days.

**Packing:-**

Box of 4x250 gm, 500 gm, 1000 gm



## پری۔ چک گارڈ

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

سلفا کلور پیراڈائزین سوڈیم..... بی پی..... 10 گرام

ٹرائی میتھوپریم..... بی پی..... 2 گرام

**علامات:-** پری چک گارڈ پانی میں حل پذیر پاؤڈر نہایت مناسب علاج ہے۔ بیکٹریل انفیکشنز کے لئے مرغیوں میں: کوئی فارم سپٹی سیسیا، پلورم، اتریک بیماری، فاول کالرو، انفیکشنز کورائیزہ، سلین جاسیٹر، سلینو، سٹیچو کوکس انفیکشنز اور سی آر ڈی کے ساتھ دوسرے متعدی انفیکشنز اور ان بیماریوں کی وجہ سے سڑکس کا آجانا۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

200 ملی گرام فی کلو گرام وزن یا 1 سے 1.5 گرام فی لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 6 روز تک پلائیں۔ پری چک گارڈ پانی میں حل پذیر پاؤڈر کی مقدار پانی کی ٹینکی سے نصت پانی نکال کر اچھی طرح حل کر لیں پھر باقی پانی سے ٹینک بھر دیں اور اسی طرح فیڈ میں حل کر دیں۔

انتہاء: دو ماہ پانی 24 گھنٹے میں استعمال کر لیں۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت و دودھ: 4 دن

**پیکنگ:**

4x250 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Pridox 150

water soluble powder

Each gm contains: **Composition:-**

Doxycycline (hyclate) ---- 150 mg

## Indications:-

Respiratory infections, CRD, CCRD, Enteritis caused by salmonella, Fowl Cholera and Staphylococcus etc.

## Activity:-

Doxycycline belongs to tetracycline antibiotic active against gram positive & gram negative bacteria.

## Dosage & Administration:-

(via drinking water.)

**Poultry:** 1 gm in 2 litres of drinking water for 3~5 days.

**In Feed:** 100 gm Prodox 150 Powder per 100 kg feed.

**Calves, Sheep & Goat:** 1 gm powder per 15 kg body weight. Morning and evening then once daily for 3~5 days.

## Packing:-

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



# پری ڈوکس 150

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر

ڈوکسی سائیکلین (ہائیکلیٹ) ..... 150 ملی گرام

## دائرہ عمل:

ڈوکسی سائیکلین ٹیٹراسائیکلین گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کے خلاف مفید ہے۔

## علامات:

سانس کی بیماریاں، سی آر ڈی، آنتوں کی سوزش اور فاول کالرہ، سلیفلو کوکوسسز وغیرہ۔

## خوراک و استعمال:

(بذریعہ پینے کا پانی)۔

**مرغیاں:** 1 گرام ہڈیوکس پاؤڈر 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک روزانہ۔

**فیڈ:** 100 گرام ہڈیوکس پاؤڈر فی 100 کلو گرام فیڈ۔

**بچھڑے، بھیر بکری:** 1 گرام 15 کلو گرام وزن بچھڑے پہلے روز صبح و شام پھر دن میں ایک مرتبہ

3 سے 5 دن۔

## پیکنگ:

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Pri Tiamutin 12.5%

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm contains:

Tiamulin Hydrogen Fumerate ---- 12.5 gm

## Indications:-

It is indicated for the prevention and reduction in the severity of the diseases like mycoplasmosis, air sacculitis, chronic respiratory disease and spirochaetosis in poultry. It is also very helpful in case of poor growth of poultry and low egg production.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Treatment:** 2 gm per liter of drinking water for 5 days.

**Prevention:** 1 gm per liter of drinking water for 5 days.

## Withdrawal Time:-

Meat: 2 days.

## Packing:-

5 Kg, 10 kg.

# پری ٹیامیوٹن 12.5 فیصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ٹیامیولین ہائیڈروجن فیرومریٹ ..... 12.5 گرام

## علامات:

یہ مختلف بیماریوں مثلاً مائیکوپلازموسس، ایئر سیکولائٹس، سی آر ڈی اور سپائروٹیکس کی شدت میں کمی اور علاج کھیلنے بے حد مفید ہے۔ یہ مرغیوں میں آہستہ بڑھوتری اور انڈوں کی کم پیداوار میں بھی مفید ہے۔

**خوراک و استعمال:** (ہذریعہ پینے کا پانی)۔

علاج کھیلنے: 2 گرام فی لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن تک۔

بچاؤ کھیلنے: 1 گرام فی لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن تک۔

## ادویاتی احتیاط:

گوشت: 2 دن۔

## پیکنگ:

5 کلو گرام، 10 کلو گرام۔

# Tricid

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

Chlortetracycline(hydrochloride) - 100 mg

Neomycin(sulphate) ----- 75 mg

Furaltadone (hydrochloride) ----- 30 mg

**Activity:-**

Chlortetracycline belong to tetracycline group. it is broad spectrum bacteriostatic antibiotic.

Neomycin belongs to aminoglycoside group active against most G -ve bacteria some G +ve bacteria. used to treat diarrhea & dysentery.

Furaltadone is nitrofurant antibiotic active against enteric & respiratory infections.

**Indications:-**

Gram +ve and Gram -ve bacterial infections, coryza, CRD, Enteritis, Fowl cholera, and other complications.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:-** 1 gm in 1-2 liters of drinking water 3-5 days. or

1 gm per 5 kg body weight for 3-5 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## ٹرائی سیڈ

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر

کلورٹیترا سائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ..... 100 ملی گرام

نیومائی سین سلفیٹ..... 75 ملی گرام

فیورٹاڈون ہائیڈروکلورائیڈ..... 30 ملی گرام

**دائرہ عمل:**

کلورٹیترا سائیکلین وسیع الاثر بیکٹیریوٹیک اسٹی بائیوٹک ہے۔ اس کا تعلق ٹیٹراسائیکلین گروپ سے ہے۔

نیومائی سین امائیٹوگلائیکوسائیڈ گروپ سے تعلق رکھتی ہے یہ گرام پازٹیو اور

فیورٹاڈون نائٹروفورن اسٹی بائیوٹک ہے۔ یہ انٹیرک اور ریپارٹیری انفیکشنز کے خلاف زود اثر ہے۔

**علامات:**

گرام پازٹیو اور گرام نیگیو بیکٹریا سے پیدا ہونے والی بیماریاں، کورائو، سی آر ڈی، آنتوں کی سوزش،

فائل کالرہ اور دوسری پیچیدہ بیماریاں۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: 1 گرام 1 سے 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک۔ یا

1 گرام فی 5 کلو گرام وزن کھلنے سے 3 سے 5 دن تک۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Tylo-Doxicol

water soluble powder

**Composition:-** Each Kg contains;

Tylosin Tartrate ----- 140 gm

Colistin Sulphate ----- 1200 MIU

Doxycycline Hcl ----- 160 gm

**Indication:-**

Respiratory and gastro-intestinal infections caused by E.Coli, Salmonella, Mycoplasma, Pasteurella, Bordetella, Streptococcus, Campylobacter and haemophilus, species, sensitive to Tylosin, Colistin & Doxycycline.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:** Treatment: 1gm per 2 Liter of drinking water for 3-5 days.

Prevention: 1 gm per 4 Liter of drinking water for 3-5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 72 hours

**Packing:-**

100 gm, 250 gm, 500 gm, 1kg



## ٹائلو ڈوکسی کول

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی کلوگرام پاؤڈر

ٹائیلوسین ٹارٹریٹ ----- 140 گرام

کولیسٹین سلفیٹ ----- 1200 ایم یو

ڈوکسی سائیکلین (ایچ سی ایل) ----- 160 گرام

**علامات:**

نظام تنفس اور نظام امہ نظام کے انفیکشنز جو ای کولائی، سالمونیلہ، مائیکوپلازما، پاستوریلہ، بورڈیٹیلہ، سٹریپٹوکوکس، کمپیلوبیکٹر اور ہیملوفیلس، بیکٹیریا کی اقسام سے ظاہر ہوں اور ٹائیلوسین، کولیسٹین اور ڈوکسی سائیکلین سے حساس ہوں۔

**خوراک و استعمال:** (بزرگ پرینے کا پانی)۔

مرغیاں: علاج:- 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 3 سے 5 دن۔

بیماری سے بچاؤ:- 1 گرام 4 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 3 سے 5 دن۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: 72 گھنٹے۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 250 گرام، 500 گرام، 1 کلوگرام۔

# TC Dox

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm Contains:

Tylosin Tartrate ----- 10 gm  
Colistin Sulfate ----- 250,00,000 IU  
Doxycycline (as hyclate) --- 10 gm

**Indications:-**

TC Dox is a combination of broad spectrum antibiotics which is highly effective against pathogens involved in all respiratory infections like Coryza, CRD, Pasteurellosis, Omphalitis Synovitis, Pneumo-enteritis.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:**

**Treatment:-** 1 gm per 2 liter in drinking water for 3-5 days.

**Prevention:-** 1 gm per 4 liter in drinking water for 3-5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 72 hours.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1 kg, 5 kg.



## ٹی سی ڈوکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ٹائیلسین ٹارٹریٹ ..... 10 گرام

کولیسٹین سلفیٹ ..... 250,000,00 آئی یو

ڈوکسی سائیکلین (ہیج سی ایل) ..... 10 گرام

**علامات:**

ٹی سی ڈوکس وسیع اثر رکھنے والی اینٹی بائیوٹکس کا مجموعہ ہے جو نہایت ذود اثر ان جراثیم کے خلاف ہے جو نظام تنفس اور نظام انہدام کی ان بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جیسے کورائیزہ، سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، اینٹرائس، کوئی ٹیسی، لوسسز، پاپچوریو، سسز، اوم، فیلپٹس، نیومائٹس۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: علاج:- 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 3 سے 5 دن۔

بیماری سے بچاؤ:- 1 گرام 4 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 3 سے 5 دن۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: 72 گھنٹے۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1 کلو گرام، 5 کلو گرام۔

# Weal-Tylocolis

water soluble powder

**Composition:-** Each 1000 gm Contains;

Tylosin Tartrate ----- 100 gm

Colistin Sulphate ----- 1200 MIU

**Indications:-**

For the treatment and prevention of gram positive and gram negative bacteria, sensitive to tylosin and colistin antibiotics combined to get dual antibacterial effect against diseases, such as CRD complex, airsacculitis, mycoplasmosis, enteritis due to E-coli/ Salmonella pathogens.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:** 1 gm powder 1-2 litres of drinking water for 3-5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Egg: 72 hours.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm, Box of 4x250 gm.



# ویل ٹائیلو کولس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 1000 گرام

ٹائیلسین ٹارٹریٹ ----- 100 گرام

کولسٹین سلفیٹ ----- 1200 ایم یو

**علامات:**

گرام پازیٹیو، گرام نیگیٹیو بیکٹریا جو ٹائیلسین اور کولسٹین اینٹی بائیوٹکس سے حساس ہوں کے علاج کیلئے جن کا مشترکہ دوہرا اینٹی بیکٹریل اثر ہے۔ ان بیماریوں کے خلاف جیسے سی آر ڈی کمپلیکس، سانس کی نالیوں کی سوزش، مائیکوپلازموسسز، انٹرائیٹس، ای کولائی اور سالمونیلہ اقسام کی وجہ سے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: 1 گرام پاؤڈر 1 سے 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام، 4x250 گرام۔

# Lincopri 44

oral powder

**Composition:-** Each 100 gm contains;  
Lincomycin Hydrochloride — 4.400 gm

## Activity:-

Lincomycin belongs to lincosamide group. it is active against G +ve bacteria, staphylococci, streptococci, clostridium spp, Anaerobes and Mycoplasma.

## Indications:-

Lincopri 44 is indicated to treat diseases caused by G +ve bacteria, Anaerobes and Mycoplasma, necrotic enteritis, CRD, to increase feed efficiency (FCR), pigmentation, wet droppings, loss of weight, to decrease mortality in poultry.

## Dosage & Administration:- (via feed)

**To improve weight FCR:** 50 gm per ton of feed.

**To control necrotic enteritis/ CRD chronic respiratory disease:** 100 gm per ton of feed.

**To treat necrotic enteritis & CRD:** 250-500 gm per ton of feed.

## Withdrawal Time:-

2-4 hours before slaughter.

## Precautions:-

Open bag in dry place to prevent caking.

Store in a cool dry place at room temperature.

Thoroughly mix in feed before use.

## Packing:-

1000 gm, 1.5 Kg, 10 Kg.



# لینکوپری ۴۴

اورل پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

لنکومائی سین ہائیڈروکلورائیڈ — 4.400 گرام

## دائرہ عمل:

لنکومائی سین لکوسائیڈ گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ گرام مثبت ٹیکٹیریا، سٹیفیلوکوکائی، سٹریپٹوکوکائی، کلاسٹریڈیم اقسام این ایروبز اور مائیکوپلازما کے خلاف زود اثر ہے۔

## علامات:

لنکوپری ۴۴ مرغیوں میں گرام مثبت ٹیکٹیریا، این ایروبز، مائیکوپلازما سے ہونے والی بیماریوں، ٹیکروٹک انٹرائینس، اور سی آر ڈی کے علاج، فید کی کارکردگی (ایف سی آر) کو بڑھانے، پیگ منٹیشن، پتلی بیٹ، وزن میں کمی اور شرح اموات کو روکنے کیلئے مفید ہے۔

## خوراک و استعمال: (بذریعہ فید)

وزن بڑھانے اور فید کی کارکردگی میں بہتری کیلئے: 50 گرام فی ٹن فید میں استعمال کریں۔  
انٹرائینس اور سی آر ڈی کے کنٹرول کیلئے: 100 گرام فی ٹن فید میں استعمال کریں۔  
انٹرائینس اور سی آر ڈی کے علاج کیلئے: 250 سے 500 گرام فی ٹن فید میں استعمال کریں۔

## ادویاتی احتیاط:

گوشت کیلئے 2 سے 4 گھنٹے

## انتباہ:

فید میں اچھی طرح ملا کر مکس کریں۔ پیگ کو خشک جگہ پر کھولیں تاکہ کیلنگ نہ ہو۔

## پیکنگ:

1000 گرام، 1.5 کلو گرام، 10 کلو گرام۔

# Colis 120

Oral liquid

**Composition:-** Each ml contains:

Colistin Sulphate ----- 120 mg

**Indication:-**

Bacterial Enteritis and infections caused by gram negative bacteria E.Coli, Salmonella, Shigella, Proteus and Pseudomonas spp. in Poultry (all ages), Calves and Goats.

**Dosage and Administration:-** (Oral Use Only)

Broilers, Layers, Breeders & Poulets etc.:

4 - 5 ml per 100 kg body weight (Eq. to 5 - 6 mg of Colistin Sulphate per kg body weight) or 1 ml per 5 liters of drinking water for 3-5 days.

Calves, Sheep & Goats etc:

4 - 5 ml per 100 kg body weight (Eq. to 5 - 6 mg per kg body weight) in drinking water, with milk or milk replacer.

**Note:** Dosage can be adjusted as per body weight and severity of disease.

Medicated water should be used within 24 hours.

**Withdrawal Time:-**

Poultry, Turkey etc.: Meat & Eggs: 2 days.

**Packing:-**

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml



# کولس 120

اورل لیکوئیڈ

**اجزاء:** فی ملی لیٹر

کولسٹین سلفیٹ ..... 120 ملی گرام

**علامات:**

بیکٹیریئل انٹرایکٹس اور گرام نیگیو بیکٹیریا (ای کولائی، سالمونیلہ، شیگیلا، پروٹیس، سودوموناز) سے پیدا ہونے والے انفیکشنز، مرغیوں (ہر عمر) پچھڑے، بھیرے، بکری وغیرہ میں۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کیلئے)۔

برائیلر، لیئر، بریڈرز اور پولٹس وغیرہ کیلئے:۔ 4 سے 5 ملی لیٹر 100 کلو گرام وزن (مساوی 5 سے 6 ملی گرام کولسٹین سلفیٹ فی کلو گرام وزن) یا 1 ملی لیٹر کولس 120 لیکوئیڈ 5 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن روزانہ۔

پچھڑے، بھیرے، بکری وغیرہ کیلئے:۔ 4 سے 5 ملی لیٹر 100 کلو گرام وزن (مساوی 5 سے 6 ملی گرام کولسٹین سلفیٹ فی کلو گرام وزن) پینے کے پانی، دودھ یا ملک ریلیسر میں ملا کر دیں۔  
نوٹ: خوراک کی کمی پیشی بیماری کی شدت اور وزن کے مطابق کریں۔  
دوا ملا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کریں۔

**ادویاتی احتیاط:**

مرغیاں، بڑکیر وغیرہ: گوشت، انڈے: 2 دن

**پیکنگ:**

100 ملی لیٹر، 250 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر۔

# Pri-En 20

## Oral Liquid

**Composition:-** Each 100 ml contains;

Enrofloxacin — 20 gm

### Indication:-

For the prevention & treatment of infections caused by E-coli, Salmonella, Mycoplasmas, Haemophilus gallinarum, Pasteurella multocida, Clostridia perfringens and other gram +ve, gram -ve organism sensitive to Enrofloxacin and diseases like Coryza, CRD, CCRD, Enteritis, Fowl cholera Colibacillosis, secondary bacterial complications of viral infections.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Poultry:-** 1 ml in 3-4 liters of drinking water for 3-5 days.

**Note:-** In case of salmonella treatment can be given up to 5 days.

Medicated water should be used within 24 hours.

**Cattle, Foals, Sheep & Goat:-** 5 ml per 75-150 kg BW. for 3-5 days.

### Withdrawal Time:-

Meat: 12 days.

### Packing:-

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.



## پری-این 20

اورل لیکویڈ

**اجزاء:** فی 100 ملی لیٹر

ایزوفلوکساسین ..... 20 گرام

### دائرہ عمل:

ایزوفلوکساسین مینوگلوبن گروپ سے تعلق رکھنے والی اینٹی بائیوٹک ہے جو بیکٹیریل ڈی این اے رپلیکیشن کو روکتی ہے۔ یہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کے خلاف موثر ہے۔

### علامات:

مویشی، بچھیرے، بکری اور مرغیوں میں نظام انہضام، ریپائیرٹری انفیکشن، یورتری ٹریکٹ انفیکشن جو ایزوفلوکساسین سے حساس بیکٹیریا (گرام پازیٹیو و گرام نیگیٹیو) جیسا کہ پائیلو بیکٹر، ای۔کولائی، تیموفلس، مائیکوپلازما، پاپتومور اور سالمونیلہ اقسام کیلئے۔

### خوراک و استعمال:

مرغیوں میں: 1 ملی لیٹر 3 سے 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

نوٹ: سالمونیلہ کیلئے علاج 5 روز متواتر کیا جاسکتا ہے۔ دوا ملا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کر دلائیں۔

مویشی، بچھیرے، بکری: 5 ملی لیٹر فی 75 سے 150 کلو گرام وزن کیلئے 3 سے 5 دن۔

### ادویاتی احتیاط:

گوشت 12 دن۔

### پیکنگ:

100 ملی لیٹر، 250 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر۔

# Prinor 20

## Oral Liquid

**Composition:-** Each 100ml contains;

Norfloxacin --- 20 gm

### Indications:-

Prinor 20 has broad spectrum bactericidal activity against gram positive and gram negative bacteria.

Prinor 20 is very effective antibiotic in controlling and treating Coli-bacillosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, Staphylococcus and Streptococcus. It is readily absorbed and distributed in animal tissue by achieving therapeutic blood levels to inhibit bacterial cell by blocking the enzyme of the DNA replication.

### Dosage & Administration:- (for oral use only.)

**Poultry, calves, sheep & goat:-** 12 mg per Kg body weight or

1ml per 4 liters of drinking water 3-5 days.

**In cases of Salmonellosis, Fowl Typhoid, Paratyphoid, Fowl Cholera:-** 1ml per 2 liters of drinking water up to 7 days.

**Calves, Sheep, Goat:-** 1ml/2 Liters of drinking Water for 3 days.

### Packing:-

500 ml, 1 Liter, 5 liters.



## پرینور 20

اورل لیکویڈ

**اجزاء:** فی 100 ملی لیٹر:

نورفلوکساسن ..... 20 گرام

### علامات:

پرینور 20 گرام پازیٹیو بیکٹریا اور گرام نیگیٹو بیکٹریا کے خلاف وسیع بیکٹریا کش عمل کی حامل ہے۔ پرینور 20 کوئی ایسی دوا نہیں ہے، سالمونیلوسس، مائیکوپلازموسیس، سٹیفیلوکوکس اور سٹریپٹوکوکس کے سد باب اور علاج کیلئے نہایت مؤثر ایسی بایوٹک ہے۔ یہ حیوانی نشوونما میں تیزی سے جذب اور تقسیم ہو کر خون میں معالجی سطح حاصل کرتی ہے اور بیکٹریا کی نشوونما اور بڑھوتری کو DNA انیٹر ائم کی بندش سے عمل میں لاتی ہے۔

### خوراک و استعمال:

(صرف پلانے کیلئے)۔

مرغیوں، بچھڑوں، بکریوں اور بکریوں میں بطریق وزن پرینور 12 ملی گرام فی کلو گرام وزن کیلئے۔ (یا)

1 ملی لیٹر 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

سالمونیلوسس (فاول ٹائیفائیڈ، پیرائٹیفائیڈ، فاول کالرو) کے انفیکشن میں 1 ملی لیٹر 2 لیٹر پانی

میں 7 روز۔

بچھڑوں، بکریوں وغیرہ: 1 ملی لیٹر فی 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 روز۔

### پیکنگ:

500 ملی لیٹر، 1 لیٹر، 5 لیٹر۔

## Pri-En Colis

## Oral Liquid

**Composition:-** Each 100 ml contains:

Enrofloxacin ——— 10 gm

Colistin Sulfate — 50,000,000 IU

**Indication:-**

Pri-En Colis is an effective drug against the following diseases & bacteria, CRD, CCRD, E. Coli Mycoplasmosis, Coryza, Salmonellosis, Avian Cholera, Staphylococci, Streptococci, Colisepticemia, Enteritis etc.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Poultry:-** 1 ml per 1-2 liters of drinking water for 3-5 days.

**Note:** Medicated water should be used within 24 hours.

### Withdrawal Time:-

Egg & Meat: 9 days.

**Packing:-**

100 ml, 500 ml, 1000 ml.



پری این کولس

اور لیکن

### اجزاء: فی 100 ملی لیٹر

ایزو فلوکسائین ..... 10 گرام

کوئٹہ سلیفٹ — 50,000,000 آئی یو

### علامات:

پہری این کوس مندرجہ ذیل بیماریوں اور ٹیکسیریا کے خلاف ایک پڑاؤ دوا ہے۔ سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، ای کو لائی، مائیکوپلازموسسز، کورائیزہ، سالمونیلوسسز، ایبین کالرہ، شیشیلو کو کائی، سر پیٹو کو کائی، کوئی سچھی سیمیا، انٹرکٹس وغیرہ۔

**خوراک و استعمال:** (ہندریعہ پیٹنے کا پانی)۔

مرغیاں (ہر عمر) پتھر دے، پتھر دے، بھیر، بھیر، بھیر:

1 ملی لیٹر 1 سے 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک۔

نوٹ: دو املا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کریں۔

### ادویاتی احتیاط:

گوشت واندے: 9 روز۔

پکنگ:

100 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر۔

# Pri-Tiamutin

oral liquid

**Composition:-** Each 100 ml contains:

Tiamulin Hydrogen Fumerate ---- 12.5 gm

**Indications:-**

It is indicated for the prevention and reduction in the severity of the diseases like mycoplasmosis, air sacculitis, chronic respiratory disease and spirochaetosis in poultry. It is also very helpful in case of poor growth of poultry and low egg production.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Treatment:** 2 ml per liter of drinking water for 5 days.

**Prevention:** 1 ml per liter of drinking water for 5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat: 2 days.

**Packing:-**

100 ml, 500 ml, 1000 ml.

# پری تیا میوٹن

اورل لیکوئیڈ

**اجزاء:** فی 100 ملی لیٹر

تیا میو لین ہائیڈروجن فیرومریٹ — 12.5 گرام

**علامات:**

یہ مختلف بیماریوں مثلاً مائیکوپلازموسس، اسپیریکیولائٹس، سی آر ڈی اور سپائروٹیکس کی شدت میں کمی اور علاج کھلنے کے بعد مفید ہے۔ یہ مرغیوں میں آہستہ بڑھوتری اور انڈوں کی کم پیداوار میں بھی مفید ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

علاج کھلنے: 2 ملی لیٹر فی لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن تک۔

بچاؤ کھلنے: 1 ملی لیٹر فی لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن تک۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت: 2 دن۔

**پیکنگ:**

100 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر۔

# Antibiotics

## Penicillin/ Derivatives + Combinations



# C-Mox

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each 100 gm Contains:

Amoxycillin Trihydrate --- 15 gm.

Colistin Sulphate ----- 50,000,000 IU

**Indication:-**

It is a unique combination of two strong antibiotics that is highly effective for the treatment of gastrointestinal respiratory and urogenital tract problems in poultry and small ruminants. It should be used in coryza, E-coli, Fowl typhoid, Bronchopneumonia C.R.D, and other associated respiratory problems.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:** 0.11-0.22 gm per kg body weight daily.

1 gm per 1-2 liter of drinking water for 3-5 days.

**Feed:** 1 kg per tone of feed for 3-5 days.

**Calves:** 10 gm per 50 kg body weight for 3-5 days.

**Sheep & Goats:** 10 gm per 50 kg body weight for 3-5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 8 days

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm, 5 kg.



## سی۔ موکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ایموکسی سیلین ٹرائی ہائیڈریٹ ..... 15 گرام

کولیسٹین سلفیٹ ..... 50,000,000 آئی یو

**علامات:**

سی موکس دو اینٹی بائیوٹکس کا مرکب ہے۔ یہ بیکٹیریل بیماریوں کے بچاؤ اور علاج کھیلنے ایک موثر دوا ہے جو (ECM) اربلی چک موربیلی، زردی کے انفیکشنز، نمونیا، کھانسی، بخار، نزلہ اور آنتوں کی سوزش جیسی بیماریوں کھیلنے موثر ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذر یو پینے کا پانی)۔

مرغیاں: 0.11 سے 0.22 گرام فی کلو گرام وزن روزانہ۔

1 گرام 1 سے 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

فید: 1 کلو گرام فی ٹن فید میں 3 سے 5 دن۔

بچھڑے: 10 گرام فی 50 کلو گرام بلحاظ وزن 3 سے 5 دن۔

بھیڑ، بکری: 10 گرام فی 50 کلو گرام بلحاظ وزن 3 سے 5 دن۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: 8 دن

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام، 5 کلو گرام۔

# Lincomox-Plus

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm powder contains:-

Amoxicillin Trihydrate ---- 20.000 gm

Lincomycin Base ----- 8.800 gm

Spectinomycin Base ----- 8.800 gm

**Activity:-**

Amoxicillin is semi-synthetic penicillin active against Gram + ve Gram - ve bacterial. it inhibits the bacterial cell wall.

lincomycin belong to lincosamide group of antibiotic and spectinomycin belongs to aminocyclitol. active against Gram +ve, Gram -ve and mycoplasma.

**Indications:-**

It is indicated for the treatment of infections caused by mycoplasma, streptococcus, Ecoli, pasteurella, salmonella and staphylococcus. In case of broiler and breeders it is especially very effective for the prevention and treatment of mycoplasma infections and their complications with coryza, coli-bacillosis and salmonella.

It is also useful in case of secondary infectious to viral diseases .

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:**

**Treatment:** 1 gm in 2 liters of drinking water for 3- 5 days continuously.

**Prevention:** 1 gm in 4 liters of drinking water for 3- 5 days continuously.

**Packing:-**

100 gm, 250 gm, 500 gm, 1000 gm.



## لینکوموکس پلس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ایموکسی سیلین ٹرائی ہائیڈریٹ ..... 20.000 گرام

لنکومائی سین بیس ..... 8.800 گرام

سپیکٹینومائی سین بیس ..... 8.800 گرام

**دائرہ عمل:**

ایموکسی سیلین سیمی سنٹھٹک پنسلین ہے یہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کے خلاف اثر رکھتی ہے یہ بیکٹیریا کی سیل وال کوٹھنے سے روکتی ہے۔

لنکومائی سین لنکوسامائیڈ گروپ کی امینی بائیونک ہے۔ یہ گرام پازیٹیو، بیکٹیریا اور مائیکوپلازما کے خلاف اثر رکھتی ہے۔

سپیکٹینومائی سین امائیٹو سائیکلٹول امینی بائیونک ہے یہ گرام پازیٹیو، گرام نیگیٹیو بیکٹیریا اور مائیکوپلازما کے خلاف اثر رکھتی ہے۔

**علامات:**

یہ مائیکوپلازما، سٹریپٹوکوکس، ای کولائی، پائچوریا، سالمونیلہ اور سٹیفیلوکوکس کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز، براڈیلر اور بریڈر میں یہ مائیکوپلازما اور اس کی وجہ سے ہونے والے پیچیدہ انفیکشنز۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: علاج:- 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

بچاؤ:- 1 گرام 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Pri-Bacstin

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each 100 gm powder contains:

Amoxicillin as amoxicillin Trihydrate --- 20 gm

Colistin Sulphate ----- 50 MIU

**Indications:-**

Pri-Bacstin wsp is indicated for the infections of gastro intestinal, respiratory and urinary tract infections caused by gram +ve, gram-ve microorganisms sensitive to amoxicillin & colistin like campylobacter, clostridium, corynebacterium, E.coli, haemophilus, pasteurella, salmonella, penicillinase negative staphylococcus and streptococcus spp.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:-** 1 gm in 2 liters of drinking water. or

0.11-0.22 gm per Kg body weight water for 3-5 days.

**Note:** Before adding to drinking water make a pre-solution of 1 kg Pri-Bacstin wsp in 20 liters water.

**Feed:-** 20 gm/ 100 kg of feed for 3-5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat 8 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm



## پری بیکسٹین

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

اموکسی سیلین بطور اموکسی سیلین ٹرائی ہائیڈریٹ ..... 20 گرام

کولسٹین سلفیٹ ..... 50 ایم یو

**علامات:**

پری بیکسٹین نظام اہضام، نظام تنفس اور یوٹی آئی انفیکشنز جن کی وجہ گرام پازٹیو، گرام نیگیو مائیکرو آرگنزم ہوں۔ جو اموکسی سیلین اور کولسٹین کے دائرہ اثر میں آئیں جیسے کمپائلو بیکٹر، کلاسٹریڈیم، کورائٹی بیکٹیریم، ای کولائی، ہیموفلس، پاپچوریلا، سالمونیلہ، پینسیلین نیز نیگیو سٹیلوکوکس اور سٹریپٹوکوکس اقسام۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

**مرغیاں:** { 1 گرام 2 لیٹر پانی میں۔ یا 0.11 سے 0.22 گرام فی کلو گرام وزن کے لیے 3 سے 5 دن تک۔

**نوٹ:** پانی میں شامل کرنے سے پہلے 1 کلو گرام پری بیکسٹین 20 لیٹر پانی میں ملا کر پری سلوشن بنالیں۔

**فید:** 20 گرام فی 100 کلو گرام فید میں 3 سے 5 دن۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت 8 دن

**احتیاط:**

مرغیاں یا ایسے دوسرے جانوروں میں جو اموکسی سیلین یا کولسٹین سے ذود جی رکھتے ہوں۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Pri-Lincomac

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm powder contains:

Amoxicillin Trihydrate --- 10.000 gm

Lincomycin Base ----- 5.000 gm

Spectinomycin Base ---- 5.000 gm

**Activity:-**

Lincomycin: is a Lincosamide group antibiotic. it is active against gram negative most gram positive pathogens and Mycoplasmas.

Spectinomycin: is an aminocyclitol antibiotic active against gram -ve, gram + ve micro. organism and pathogens.

Amoxicillin: is a semi-synthetic penicillin active against gram positive and gram negative bacteria. it acts by inhibiting bacterial cell wall synthesis

**Indications:-**

it is indicated for the treatment of infectious diseases caused by Mycoplasma, Streptococcus, E-coli, Pasteurella, Salmonella and staphylococcus. In case of broiler and breeders it is especially very effective for the prevention and treatment of Mycoplasma infections and their complications with coryza, coli-bacillosis and salmonella.

it is also useful in case of secondary infections to viral diseases and coccidiosis.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

Poultry:

**Treatment:** 1 gm in 1 liters of drinking water for 3- 5 days continuously,

**Prevention:** 1 gm in 2 liters of drinking water for 3- 5 days continuously,

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.

## پری لینکومیک

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ایموکسی سلین ٹرائی ہائیڈریٹ ..... 10.000 گرام

لنکومائی سین بیس ..... 5.000 گرام

سپیکٹینومائی سین بیس ..... 5.000 گرام

**دائرہ عمل:**

ایموکسی سلین سبھی منتخب میکروبائیٹس کے خلاف کارآمد ہے جو گرام مثبت اور گرام منفی باکٹیریا کے خلاف کارآمد ہے۔ یہ بیکٹیریا کی میل وال بننے کے عمل کو روکتی ہے۔

لنکومائی سین لنکوسامائیڈ اینٹی بائیوٹک ہے یہ زیادہ گرام مثبت اور کچھ گرام منفی باکٹیریا اور مائیکوپلازما کے خلاف کارآمد ہے۔

سپیکٹینومائی سین امائینو سائیکلی ٹول اینٹی بائیوٹک ہے جو گرام مثبت اور گرام منفی باکٹیریا کے خلاف کارآمد ہے۔

**علامات:**

مائیکوپلازما، سٹریپٹوکوکس، ای کولائی، پاستوریل، سالمونیلہ اور سٹیفیلوکوکس کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز، بڑا ٹیلر اور بریڈر میں یہ مائیکوپلازما اور اس کی وجہ سے ہونے والے پیچیدہ انفیکشنز کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

**مرغیاں:**

علاج: 1 گرام 1 لیٹر پینے کے پانی میں تین سے پانچ دن روزانہ۔  
پچاؤ: 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں تین سے پانچ دن روزانہ۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔



# Primox 50%

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm contains:

Amoxicillin as amoxicillin trihydrate --- 50.00 gm

**Activity/ Indications:-**

Primox 50% (Amoxicillin) is a broad spectrum bactericidal drug cover Gram +ve, Gram ---ve bacteria particularly respiratory gastrointestinal infections caused by Haemophilus, E.Coli, salmonella, clostridia, staphylococcus, streptococcus, pathogens in poultry and cattle (calves) such as coryza, enteritis, diarrhea (due to E.Coli, salmonella) pasteurellosis, pneumonia enteritis etc.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water/ Feed.)

**Poultry:-** 10-20 mg per kg body weight or 1 gm in 5-10 liters of drinking water for 3-5 days.

**in Feed:-** 20 gm per 100 kg feed for 3-5 days.

**Calves:-** 20-40 mg per kg body weight or 1-2 gm per 50 kg body weight in drinking water or with milk replacer for 3-5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 14 days

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## پری موکس 50 فیصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ایموکسی سیلین بطور ایموکسی سیلین ٹرائی ہائیڈریٹ ..... 50 گرام

**دائرہ عمل/علامات:**

پری موکس 50 فیصد (ایموکسی سیلین) ایک وسیع دائرہ عمل رکھنے والی بیکٹیریا کش دوا ہے، جو گرام پازیٹیو و گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کے خلاف ڈوڈاثر ہے خصوصاً ریپائریٹری، نظام اضمہ نام کے انفیکشنز جن کا باعث تیموفیس، ای کولائی، سالمونیا، کلاسترڈیا، سٹیفیلوکوکس اور سٹرپٹوکوکس بیکٹیریا کی اقسام ہوں۔ جیسے مرغیوں، مویشیوں (چھڑوں) میں کورائیزہ، انٹرائٹس، ڈائیریا (بوجہ ای کولائی، سالمونیا) پائچوریلو سسز، نمونیا انٹرائٹس وغیرہ۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی یا فید)

مرغیاں: { 10 سے 20 ملی گرام فی کلو گرام وزن کے لیے۔ یا 1 گرام 5 سے 10 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

فید: 20 گرام فی 100 کلو گرام فید میں 3 سے 5 دن۔

چھڑے: 20 سے 40 ملی گرام فی کلو گرام وزن کے لیے۔ یا

1 سے 2 گرام فی 50 کلو گرام وزن کے لیے پانی میں یا متبادل دودھ میں 3 سے 5 دن۔

فید: 20 گرام فی 100 کلو گرام فید میں 3 سے 5 دن۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: 14 دن

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Primox 70%

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm powder contains:

Amoxicillin trihydrate --- 80gm equivalent to 70 gm of amoxicillin base.

**Indications:-**

Primox 70% is effective against Gram positive and Gram Negative bacteria including E-coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Staphylococci and Streptococci. Primox 70% is also very effective to prevent secondary bacterial infections during the course of the viral disease. Primox 70% is useful in cases of coliform septicemia, Fowl cholera, Chronic respiratory disease (CRD) and Pullet disease.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water/ Feed.)

**In Poultry, Fowls, Turkeys and Calves etc.:** 0.1-0.2 gm per 10 kg body weight equi. to (7-14 kg body weight).

**Treatment:** 1 gm powder in 5 liters of drinking water for 3-5 days.

**Preventive:** 1 gm powder in 10 liters of drinking water for 3-5 days.

**In feed:** up to 4 weeks 12-24 gm 100 kg of feed.

over 4 weeks 20-40 gm 100 kg of feed.

**Calves:** 1-2 gm in 10 liter milk.

**Withdrawal Time:-**

Eggs: 1 days, Meat: 14 days.

**Packing:-**

100 gm, 250 gm, 500 gm, 1000 gm.



## پری موکس 70 فیصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** ہر 100 گرام پاؤڈر

ایموکسی سیلین بطور ڈرائی ہائیڈریٹ 80 گرام مساوی 70 گرام ایموکسی سیلین بیس

**دائرہ عمل/علامات:**

پری موکس 70 فیصد گرام پازیٹیو و گرام نیگیٹیو بیکٹیریا مثلاً ای کولائی، کلےسیلیا، پروٹیس، سالمونیلہ، سٹیفیلوکوکس اور سٹریپٹوکوکس بیکٹیریا کے خلاف بہت موثر ہے۔ پری موکس 70 فیصد وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے دوران سیکنڈری انفیکشن کو روکتی ہے۔ یہ کوئی فارم سپلیمنٹ نہیں، فائول کالرو، سی آر ڈی اور چوڑوں کی بیماری میں مفید ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی یا فید)

مرغیاں، بڑکیز اور پچھڑے وغیرہ: { 1.0 سے 0.2 گرام 10 کلو گرام وزن کے لیے۔ یا بحساب (7 سے 14 ملی گرام فی کلو گرام وزن کے لیے۔

**معالجتی:** 1 گرام 5 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن کے لیے۔

**تحفظی:** 1 گرام 10 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن کے لیے۔

4 ہفتے تک 12 سے 24 گرام 100 کلو گرام فید۔

4 سے زیادہ ہفتے تک 20 سے 40 گرام 100 کلو گرام فید۔

پچھڑوں میں: 1 سے 2 گرام 10 لیٹر تیار دودھ میں۔

**ادویاتی احتیاط:**

مرغی رزیدو گوشت: 14 دن، پچھڑے گوشت: 14 دن

**پیکنگ:**

100 گرام، 250 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Primox Plus

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm contains:

Amoxicillin as Amoxicillin Trihydrate ----- 16.000 gm

Clavulanic Acid as potassium clavulante --- 4.000 gm

**Activity:-**

Primox Plus is combination of 2 drugs that act synergetically to gather to treat and prevent bacterial infections clavul B-lactamase produce by bacteria would ordinaly amoxicillin inactive..

**Indications:-**

Primox Plus is effective against respiratory diseases including ORT, CRD, bacterial arthritis. It is especially effective against lactamase producing bacteria, It is effective against E.Coli, Staphylococci, Streptococci, Haemophilus Paragallinarum, Proteus spp, Salmonella, Clostridium and Listeria.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water/ Feed.)

**Poultry:-** 100gm in 200 liters of drinking water or  
1 gm in 2 Liters of drinking water for 5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 14days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



# پری موکس پلس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** 100 گرام پاؤڈر

ایموکسی سیلین بطور ایموکسی سیلین ٹرائی ہائیڈریٹ ..... 16.000 گرام

کلیو لینک ایسڈ ..... 4.00 گرام

**دائرہ عمل:**

پری موکس پلس 12 ایسی ڈرگز کا مرکب ہے جو سرکٹریل بیکٹریل انفیکشنز کے علاج اور بچاؤ کیلئے عمل کرتی ہے۔ کلیو لینک ایسڈ بیکٹریا سے پیدا ہونے والے پینالیکٹائز کو روکتی ہے۔ جو کہ عام طور پر ایموکسی سیلین کے اثر کو کم کرتا ہے۔

**علامات:**

پری موکس پلس مرغیوں میں سانس کی بیماریوں مثلاً او آر ٹی، سی آر ڈی، بیکٹیریئل آرٹھرائٹس وغیرہ میں مفید ہے۔ یہ خاص طور پر لیکٹیمیوز پیدا کرنے والے بیکٹیریہ کے خلاف مفید ہے۔ یہ ای کو لائی، شیفلو کوکس، سٹریپٹوکوکس، ہیوفس، پروٹیس، سالمونیلہ، کلاسیڈیا اور لیسٹریا کے خلاف بھی مفید ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی یا فید)

مرغیاں: { 100 گرام پاؤڈر 200 لیٹر پینے کے پانی میں - یا  
1 گرام پاؤڈر 2 لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن روزانہ۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: 14 دن

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Wealmox-Plus

water soluble powder

**Composition:-** Each 100 gm contains:

Amoxicillin as amoxicillin Trihydrate ----- 16.000 gm

Clavulanic Acid as potassium clavulante --- 4.000 gm

Bromhexine Hydrochloride ----- 0.500 gm

**Indications:-**

Wealmox-plus is effective against respiratory diseases including CRD, CCRD, bacterial arthritis. It is especially effective against lactamase producing bacteria. It is effective against E.Coli, Staphylococci, Streptococci, Haemophilus Paragallinarum, Proteus spp. Salmonella, Clostridium and Listeria.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

*Poultry:* 100 gm of Wealmox in 200 liters of drinking water. or

1 gm of Wealmox in 2 liters of drinking water for 5 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 14 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## ویل موکس پلس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

ایمکسی سیلین ٹرائی ہائیڈریٹ ..... 16.000 گرام

کلیو لینک ایسڈ ..... 4.000 گرام

بروم ہیکسین ..... 0.500 گرام

**علامات:**

ویل موکس پلس مرغیوں میں سانس کی بیماریوں مثلاً آرتھی، سی آر ڈی، بیکٹیریل آرٹھرائٹس وغیرہ اور خاص طور پر لیکٹیمیسز پیدا کرنے والے بیکٹیریا کے خلاف مفید ہے۔ یہ ای کولائی، سٹیفیلوکوکس، سٹریپٹوکوکس، ہیموفیلس، پروٹیس، سالمونیلہ، کلوسٹریڈیم اور لیسٹیریا کے خلاف بھی مفید ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: { 100 گرام پاؤڈر 200 لیٹر پینے کے پانی میں۔ یا 1 گرام پاؤڈر 2 لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن تک روزانہ۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: 14 دن۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# PriBiotic

Oral powder

**Composition:-** Each 100 gm contains:

Procain Pencillin ----- 1.200 gm

Streptomycin Sulphate ---- 3.600 gm

Zinc Bacitracin ----- 5.200 gm

**Indications:-**

PriBiotic oral powder is a very economical growth promoter with high level of protection against a variety of diseases in poultry. Combination of antibiotics having a synergistic effect against a wide range of Gram positive and Gram negative bacteria. It promotes growth and feed utility in poultry resulting a high production.

**Dosage & Administration:-** (via Feed)

**To improved feed efficiency:** 500g to 1 kg per ton of feed continuously

**For increase in weight production & hatchability:** 1 kg to 2 kg per ton of feed continuously

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: 14days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## پری بائیوٹک

اورل پاؤڈر

**اجزاء:** فی 100 گرام پاؤڈر

پروکین پینسلین ..... 1.200 گرام

سٹرپٹومائی سین سلفیٹ ..... 3.600 گرام

زنک ڈیسیٹر ایسین ..... 5.200 گرام

**علامات:**

ہدی بائیوٹک پیداوار میں اضافے کے لیے نہایت مؤثر دوا ہے جو مرغیوں میں بہت سی بیماریوں کے خلاف مفید ہے۔ مختلف اینٹی بیکٹیریل ادویات کا سزیمینک ملاپ ہے جو گرام پازٹیو اور گرام نگیٹیو بیکٹیریا کی بہت سی اقسام کے خلاف مفید ہے۔ یہ مرغیوں میں خوراک کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے اور وزن بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ فید)۔

خوراک کی کارکردگی میں اضافے کیلئے:۔ 500 گرام سے 1 کلو گرام فی ٹن فید میں۔

وزن میں اضافے اور انڈوں کی زیادہ پیداواری صلاحیتوں میں اضافے کیلئے:۔ 1 سے 2 کلو گرام فی ٹن فید میں۔


**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: 14 دن۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Anti-Coccidial/ Anti-protozoals



# Cap 600

water soluble granules

**Composition:-** Each g contains:

Amprolium HCl ---- 600 mg

**Activity:-**

Amprolium is an anti protozoal drug & in chemical structure analogue to thiamine (Vitamin B1) it inhibits the use of thiamine by protozoal parasite - protozoa (coccidia) experience deficiency of thiamine & starve from malnutrition.

**Indications:-**

Prevention and treatment of Coccidiosis in poultry.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Treatment:** 20 mg per kg body weight.

1 gm in 5 liters of drinking water for 5-7 day.

**In severity:** 1 gm in 2.5 liters of drinking water for 10 days.

**Prevention:** 1 gm Cap 600 per 30 kg body weight.

1 g in 10 liters in drinking water for 3-5 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## کیپ 600

پانی میں حل پذیر گرینولز

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر:

ایمپروولیم (ایمپروولیم ہائیڈروکلورائیڈ) — 600 ملی گرام

**دائرہ عمل:**

ایمپروولیم ایک اینٹی پروٹوزول ڈرگ ہے جو تھامین (وٹامن بی 1) کے متبادل ہے۔ جو پروٹوزول جیراسائٹ کو تھامین استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ جس کی وجہ سے کوکسیڈیا (پروٹوزوا) کو تھامین کی کمی ہو جاتی ہے اور پروٹوزوا مر جاتے ہیں۔

**علامات:**

مرغیوں میں خونی پیچش (آنت، اعمور) کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

علامت:- 20 ملی گرام فی کلو گرام وزن کیلئے۔

1 گرام 5 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 5 سے 7 دن

بیماری کی شدت:- 1 گرام 2.5 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 10 روز تک

بیماری سے بچاؤ:- 1 گرام کیپ 600 30 کلو گرام وزن کیلئے۔

1 گرام 10 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر 3 سے 5 دن

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Coxx 30

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

Sulphaclozine sodium ---- 300 mg  
(Sulphachloropyrazine monohydrate)

**Indications:-**

Coccidiosis (intestinal/ Ceecal), Fowl cholera/ Typhoid in Poultry.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water/ Feed.)

**In Poultry:** 1-2 gm of Coxx30 wsp in 1 liter of drinking water, continuously for 3 days, then 2 days plain water, repeat the dose if needed.

**In feed:-** 2 kg Coxx30 powder in one ton of feed for 3 days only.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



# کوکس 30

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** ہر گرام پاؤڈر:

سلفا کلوزین سوڈیم ---- 300 ملی گرام  
سلفا کلوروپیرازین مونو ہائیڈریٹ

**علامات:-**

خونی تھیش (آنت و عور)، فاقول، ٹائیفائیڈ، فاقول کالرو۔

**خوراک و استعمال:-** (بزرگ و بچے کے پانی یا فید)۔

مرغیاں: { 1 سے 2 گرام کوکس پاؤڈر 1 لیٹر پینے کے پانی میں لگتا 3 دن تک پھر 2 دن سادہ پانی اور اگر ضرورت ہو تو دوبارہ دیں۔

خوراک میں: 2 کلو گرام پاؤڈر 1 ٹن خوراک میں 3 دن تک۔

**پیکنگ:-**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Coprix

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Sulphadimerzine(sodium) -----              | 200.000 mg |
| Sulpaquinoxalin (sodium) -----             | 25.00 mg   |
| Pyrimethamine -----                        | 25.00 mg   |
| Furaltadine (Hydrochloride) -----          | 100.00 mg  |
| Vitamin A -----                            | 15,000 IU  |
| Vitamins K3 (Menadiol sodium Phosphate) -- | 05.00 mg   |

**Indications:-**

Intestinal/ Ceacal coccidiosis.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry (All ages), other birds.**

**Treatment:-** 1gm in 1 Liter of drinking water or (1gm per 5 kg live weight) 3 days continuously.

**Prevention:-** 1 gm in 2 liters of drinking water for 3 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## کو پریکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| سلفا ڈائی میر ازیں (بیلور سوڈیم) -----       | 200.00 ملی گرام |
| سلفا کیو نوکسالیٹن (بیلور سوڈیم) -----       | 25.00 ملی گرام  |
| پایریمیٹھامین (بیلور ہائیڈروکلورائیڈ) -----  | 25.00 ملی گرام  |
| فیورلٹاڈون (بیلور ہائیڈروکلورائیڈ) -----     | 100.00 ملی گرام |
| وٹامن اے -----                               | 15000 آئی یو    |
| وٹامن کے ۳ (میناڈائی اول سوڈیم فاسفیٹ) ----- | 05.00 ملی گرام  |

**علامات:-**

کو پریکس آنتوں اور عور کی خونی پیچش، انٹریوں کی سوزش، پلورم بیماری، فاول ٹائیفائیڈ اور فاول کالرو وغیرہ کے علاج کیلئے۔

**خوراک و استعمال:-** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں:- (چوزے، بڈا، لکڑی، بڈیڈر) اور دوسرے پرندے:-

علاج کیلئے:- 1 گرام 1 لیٹر پینے کے پانی میں۔ یا

1 گرام فی 5 کلو گرام وزن کیلئے 3 دن تک متواتر۔

احتیاط:- 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 روز کیلئے۔

نوٹ:- ضرورت کے مطابق خوراک کو 2 روز کے وقفے سے دوبارہ استعمال کریں۔

**پیکنگ:-**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Diasul-s

water soluble powder

**Composition:-** Each gram contains;

Sulphaquinoxaline sodium ----- 160 mg

Diaveridine ----- 40 mg

Vitamin K3 ----- 5 mg

**Activity:-**

DIASUL-S WSP contains sulpha-quinoxaline a sulphonamide with a marked anticoccidial activity in poultry and other/pet animals. Diaveridine has an excellent anticoccidial efficacy against *E. tenella* in combination with Sulphaquinoxaline and other *Eimeria* spp. Vitamin K3 plays an important role in the coagulation of blood by regulating and maintaining normal prothrombin formation. To improve anti-haemorrhagic activity where use of sulfonamides and other drugs cause of loss of blood.

**Indications:-**

Prevention and treatment of Coccidiosis (Ceacal & Intestinal), Fowl cholera, Fowl typhoid (Enteritis).

**Dosage & Administration:-** (via drinking water/ Feed.)

**Prevention of Coccidiosis in poultry:** 1g per 2 litres of drinking water for 2 to 3 days. (100g per 100kg of feed continuously).

**Treatment of Coccidiosis, Fowl typhoid, Fowl cholera:** 2g per

2 litres of drinking water for 3 days then 2 days plain water then repeat treatment as 1 g per 2 litres of drinking water for 2 to 3 days. (200g per 100kg of feed).

**Calves, Sheep & Rabbits:** 15 — 20g per 100 kg body weight.

**Withdrawal Time:-**

Meat: 10 days

**Packing:-**

100 gm, 250 gm, 500 gm, 1 kg jar.



## ڈایاسل - ایس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** ہر گرام پاؤڈر؛

سلفا کوئناکسالیئن ..... 160 ملی گرام

ڈایاوریڈین ..... 40 ملی گرام

وٹامن کے ۳ ..... 5 ملی گرام

**دائرہ عمل:**

ڈایاسل - ایس پانی میں حل پذیر پاؤڈر میں موجود سلفا کوئناکسالیئن ایک میجاری سلفونامائیڈ ہے جو مرغیوں اور دوسرے جانوروں پرندوں میں ایٹنی کوکسیڈیل عمل کا حامل ہے۔ ڈایاوریڈین اور سلفا کوئناکسالیئن کا ملاپ ایمریائیٹیا اور ایمریائی کی دوسری اقسام کے خلاف ایک طاقتور ایٹنی کوکسیڈیل عمل رکھتا ہے۔ وٹامن کے ۳ پروتھومین کے عمل میں بہتری اور کنٹرول کر کے انجماد خون میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ جہاں سلفونامائیڈ یا دوسری ادویات کا استعمال جریان خون کا باعث بنتا ہے۔

علامات: خونی تپش (آنت، اُمور)، فاول کالر، فاول ٹائیفائید (انٹرائٹس) کے علاج اور تحفظ کیلئے۔

**خوراک و طریقہ استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی یا فید۔)

مرغیاں، پالتو پرندے:

بڑے تحفظ خونی تپش (مرغیاں): 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں سے 3 روز (100 گرام فی 100 کلو گرام فید) بڑے علاج خونی تپش، فاول کالر، فاول ٹائیفائید: 2 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں سے 3 روز پھر 2 روز سادہ پانی پلائیں پھر 1 گرام 2 لیٹر پانی میں سے 3 روز متواتر (200 گرام فی 100 کلو گرام فید)۔  
بچھڑے، بچھڑیں اور مرغوش: 5 سے 20 گرام 100 کلو وزن کیلئے۔

نوٹ: دو اسلا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کریں۔

**احتیاط:** گوشت: 10 روز

**پیکنگ:**

100 گرام، 250 گرام، 500 گرام، 1 کلو جار۔

# Dicox Forte

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Amprolium (Hydrochloride) -----                  | 175 mg    |
| Sulfaquinoxaline (Sodium) -----                  | 175 mg    |
| Vitamin A (Retinol concentrate powder form) ---- | 15,000 IU |
| Vitamin K3 (Menadiol sodium phosphate) -----     | 5 mg      |

**Indications:-**

Dicox Forte wsp is indicated for the prevention and treatment of cecal and intestinal coccidiosis in poultry, lambs, calves and pigeons.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry & other birds:-** 50g per 80 litres of drinking water during 3 to 7 days.

**Lamb, Calves, young goats:-** 1g per 10 kg body weight for 5 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## ڈائی کوکس فورٹ

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** ہر گرام پاؤڈر

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ایمپروولیم (ہیڈروکلورائیڈ) 175 ملی گرام              | 175 ملی گرام  |
| سلفاکیوئوکسالیٹ (سڈیم) 175 ملی گرام                  | 175 ملی گرام  |
| وٹامن اے (ریٹینول کنسنٹریٹ پاؤڈر فارم) 15,000 آئی یو | 15,000 آئی یو |
| وٹامن کے ۳ (میناڈائی اول سوڈیم فاسفیٹ) 5 ملی گرام    | 5 ملی گرام    |

**علامات:**

ڈائی کوکس فورٹ پانی میں حل پذیر پاؤڈر مرغیوں و دوسرے پرندے، کتے، بچھڑے اور بھوتروں میں خونی پیچش (آنت و غور) کے علاج اور تحفظ کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں و دوسرے پرندے: 50 گرام 80 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 7 دن تک۔  
کتے، بچھڑے، میٹھے: 1 گرام پاؤڈر فی 10 کلو گرام جسمانی وزن کیلئے 5 دن۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Pancox

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Sulpamerazine (sodium) -----                          | 200 mg   |
| Sulfaquinoxaline (sodium) -----                       | 25 mg    |
| Pyrimethamine -----                                   | 25 mg    |
| Oxytetracycline (hydrochloride) -----                 | 100 mg   |
| Vitamin A (retinol concentrate) powder --             | 15000 IU |
| Vitamin K <sub>1</sub> (Menadiol sodium phosphate) -- | 5 mg     |

**Indications:-**

For the Prevention and treatment of caecal and intestinal Coccidiosis, Pullorum disease, Fowl typhoid, Fowl cholera and Enteritis.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**In Poultry:**

Prevention: 1gm powder in 2 liters of drinking water for 3-5 days.

Curative: 1 gm powder in 1 liter of drinking water for 3-5 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1 Kg.



## پین کوکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| سلفامیرازین (سولفورسوزیم).....                   | 200 ملی گرام  |
| سلفاکیوئوکسالیٹن (سولفورسوزیم).....              | 25 ملی گرام   |
| پائیریمیٹھامین.....                              | 25 ملی گرام   |
| آکسی ٹیٹراسائیکلین (سولفور ہائیڈروکلورائیڈ)..... | 100 ملی گرام  |
| وٹامن اے (ریٹینول کونسنٹریٹ پاؤڈر فارم).....     | 15,000 آئی یو |
| وٹامن کے 1 (میناڈیول سولیم فاسفیٹ).....          | 5 ملی گرام    |

**علامات:-**

پین کوکس حل پذیر پاؤڈر مرغیوں میں سیل، انٹریوں کی خونی تھپش، فاول کالری، ٹائیفائیڈ، پلورم اور انٹریوں کی سوزش کے علاج کیلئے۔

**خوراک و استعمال:-** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں:- { تحفظ: 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔  
علاج: 1 گرام 1 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

**پیکنگ:-**

100 گرام، 500 گرام، 1 کلو گرام۔

# Cap 25%

Oral Liquid

**Composition:-** Each 100 ml contains:-

Amprolium Hydrochloride ---- 25.00 gm

**Indications:-**

Cap 25% is strongly recommended in cases of coccidiosis with all types of Eimeria spp., Particularly Eimeria Tenella, the most pathogenic. It can also be used for the treatment and prevention of Eimeria Bovis and Eimeria Zumil in Cattle and Calves.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Broilers:-** 2 ml Cap 25% i.e. ( 500 mg of Amprolium) per liter of drinking water for 7 days.

**Layers:-** 0.24-1 ml per liter of drinking water i.e. (60-250 mg of Amprolium) per kg body weight for 7 days.

**Withdrawal Time:-**

Broilers: 3 days.

Layers: 10 days.

**Packing:-**

100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml.



# کیپ 25 فیصد

اورل لیکویڈ

**اجزاء:** فی 100 ملی لیٹر

ایمپروولیم ہائیڈروکلورائیڈ — 25.00 گرام

**علامات:**

مرغیوں، مویشی، بچھڑے، بھیر وغیرہ میں خونی پیچش کے علاج و روک تھاک کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (سرف پلانے کیلئے۔)

براہ نظر: 2 ملی لیٹر کیپ 25% (500 ملی گرام ایمپروولیم) فی لیٹر پینے کے پانی میں 7 روز تک۔

لیئر: 0.24 سے 1 ملی لیٹر پینے کے پانی میں (60 سے 250 ملی گرام ایمپروولیم) فی کلو گرام جسمانی

وزن کیلئے 7 روز تک۔

**ادویاتی احتیاط:**

براہ نظر: 3 روز

لیئر: 10 روز

**پیکنگ:**

100 ملی لیٹر، 200 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر

# Zuril 2.5%

oral solution

**Composition:-** Each 100 ml contains;

Toltazuril ---- 2.5 gm.

**Indications:-**

Coccidiosis in poultry calves, sheep other mammals.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

(Toltazuril 7 mg per kg body weight)

**Poultry, Pigion & Love Birds:-** 1ml per liter of water for 2 days consecutively, repeat after 5 days once, or

28 ml per 100 kg body weight for 2 days continuously, for 8-24 hours each days.

**Calves, Sheep, Rabbit:-** 2.8 -3 ml per 10 kg B.W for 2 days.

**Packing:-**

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1liter.



## زیورل 2.5

اورل لیکوئیڈ

**اجزاء:** فی 100 ملی لیٹر

ٹولٹازوریل ---- 2.5 گرام

**علامات:**

زیورل 2.5 فیصد اورل سلوشن مرغیوں میں تمام اقسام کی خونی پیچش کے مؤثر علاج اور تدارک کھیلنے استعمال کریں۔ اپنے وسیع الاثر دائرہ عمل کی وجہ سے زیورل 2.5 فیصد اورل سلوشن کاکسی باعثر بننے والے امیر یا کی تمام اقسام کے خلاف ان کی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر خاتے اور تدارک کے لیے انتہائی مؤثر دوا ہے، دوا کے خلاف مدافعت کا ظاہر ہونا کلینکل ثابت نہیں۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کھیلنے۔)

ٹولٹازوریل 7 ملی گرام فی کلو گرام وزن کھیلنے۔

مرغیاں، بکریاں اور پالتو پرندے: 1 ملی لیٹر فی لیٹر پینے کے پانی میں 2 دن روزانہ۔ 5 دن بعد خوراک دوبارہ دیں۔ یا


28 ملی لیٹر فی 100 کلو گرام وزن 2 دن روزانہ 8 سے 24 گھنٹے کے پانی میں۔

بچھرے، بھیر، خرگوش وغیرہ: 2.8 سے 3 ملی لیٹر بحساب 10 کلو گرام وزن کھیلنے 2 دن تک۔

**پیکنگ:**

100 ملی لیٹر، 250 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1 لیٹر۔

# Ectoparasitic/ Endoparasitic



# Ectofon

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains;

Trichlorfon ---- 960 mg.

**Uses:-** Cattle, Camel, Horses, Sheep, Goat, Dogs and Poultry.

**Indication:-**

For Ecto-Parasites:- To eradicate and control the migrating and skin larvae of warble fly, skin larvae of *Dermatobia hominis*, mange, *Gasterophilus* larvae, flies, sheep keds, against biting and sucking lice, red avian mites & scaly leg mites in poultry.

**1.5 gm Ectofon powder in 1 litre of water. For spraying, brushing and dipping. (Dip the birds for 1~2 minutes). Also spray animals houses (1 litre Ectofon solution for 300sq. Ft.) Properly.**

**Hypodermiosis:** 20 gm Ectofon powder in 1 litre of water for spray on the effective parts.

**Trichophytosis/ Dermatormycosis Treatment:** Prepare 6% solution to brush & spray the effected parts of the animal body.

**For Endo-Parasites:-** Ectofon is indicated for the eradication and control of Round worms; Screw worms, bots and *Schistosoma nasale*; 10 gm Ectofon powder in 100 ml of water and use to drench 0.3~0.5 ml per kg body weight.

**To Dust on:-** litters, Cages, manure heaps, organic matter, septic tanks, passages, roosts in poultry and animal houses 30 gm per m<sup>2</sup> of surface.

**Packing:-**

10 gm, 100 gm,

500 gm, 1000 gm.



## ایکٹوفون

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر

ٹرائی کلور فون ---- 960 ملی گرام

**علامات:**

مویشی (گائے، بھینس)، اونٹ، گھوڑے، بھیر، بکری اور مرغیوں وغیرہ میں بیرونی اور اندرونی کرموں کھاتے مؤثر دوا ہے۔ جوہ چڑیاں، جوئیں، مائٹس (ریڈ/سکلی)، مکھیاں (ناک، اٹھیل)، مہرو کی مکھی، مینج، مکڈز، اور پیٹ کے گول کرم، بٹس، ان کی بیضوی/ لارول/ بالغ اقسام کے خاتمہ کھاتے۔

**طریقہ استعمال:**

پہرے، برشنگ، ڈپنگ کھاتے: 1.5 گرام ایکٹوفون پاؤڈر 1 لیٹر پانی میں حل کر کے متاثرہ جانوروں پر پہرے کریں۔ (بد ذکاوت سے 2 منٹ کھاتے ڈپ کریں۔)

آئینمیل پاؤڈر سسز پر 1 لیٹر ایکٹوفون محلول 300 مربع فٹ رقبہ پر پہرے کریں۔ وارمل فلاتی (مہرو کی مکھی) کھاتے: 20 گرام فی لیٹر پانی میں حل کر کے متاثرہ حصوں پر لگائیں یا

پہرے کریں۔

ٹرائیکو فائٹو سسز/ ڈرمیٹومائی کو سسز کھاتے: 6 فیصد ایکٹوفون محلول تیار کر کے متاثرہ حصوں اور جانور کے جسم پر پہرے کریں۔


پلانے کھاتے: 10 گرام ایکٹوفون پاؤڈر 100 ملی لیٹر پانی میں حل کر کے 0.3 سے 0.5 ملی لیٹر فی کلو گرام وزن کھاتے پلائیں۔

ایکٹوفون پاؤڈر کا چھڑکاؤ: لٹرز، پنجرے، گندگی کے ڈھیر، سپینک ٹینک، روٹس، پولٹری فارم یا آئینمیل پاؤڈر سسز پر 30 گرام ایکٹوفون پاؤڈر فی مربع میٹر رقبہ پر چھڑکاؤ کریں۔

**پیننگ:**

10 گرام، 100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Anthelmintics/ Anti parasitic



# Primisole 15

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each 100 gm powder contains:

Levamisole Hydrochloride ----- 15 gm.

**Indication:-**

To eliminate stomach and intestinal worms (Round worms), Tapeworms (Moniazia spp.) and Lungworms in sheep, goat and poultry.

**Dosage:-** (Via drinking water.)

**Poultry:-** 25 mg Levamisole Hcl per kg body weight or 1 gm primisole 15 powder per 6 kg body weight.

**Sheep & Goat:-** 7.5 mg levamisole Hcl per kg body weight or 1 gm Primisole 15 powder per 20 kg body weight.

**Withdrawal times:-**

Milk: 4 days, Meat: 10 days.

**Packing:-**

5x5 gm sachet, 5x50 gm, 12x20 gm sachet.

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



# پری میزول 15

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی 100 گرام پاؤڈر

لیو امیسول ہائیڈروکلورائیڈ ..... 15 گرام۔

**علامات:-**

مویشی، بھینس، (کئے) بھیر، بکری اور مرغیوں میں پیٹ، امٹریول، پھیپھڑوں، ٹیپ کرم (مونیزیا) یا اقسام) سے تختہ اور غائتمہ کیلئے۔

**خوراک و استعمال:-** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: { 25 ملی گرام لیو امیزول ہائیڈروکلورائیڈ فی کلو گرام وزن کیلئے۔ یا 1 گرام پری میزول 15 پاؤڈر 6 کلو گرام وزن کیلئے۔

بھیریں اور { 7.5 ملی گرام لیو امیزول ہائیڈروکلورائیڈ فی کلو گرام وزن کیلئے۔ یا بکریاں: { 1 گرام پری میزول 15 پاؤڈر 20 کلو گرام وزن کیلئے۔

**ادویاتی احتیاط:-**

دودھ 4 دن، گوشت 10 دن۔

**پیکنگ:-**

5x5 گرام، 5x50 گرام، 12x20 گرام، 1000 گرام۔

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Primisol 50

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each gm contains:

Levamisol (hydrochloride) ---- 500.00 mg.

**Indications:-**

Gastro-intestinal and lung Nematodes (*Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria Obsignata*), Fowl eyeworm (*Oxyspirura mansoni*).

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

Primisol 50 wsp 36-48 mg per kg body weight.

**Poultry:** 1 gm in 2-3 liters of drinking water within 12 hours.

**Fowl eye worm:-** use 10% solution, by putting few drops, directly to the bird eye, parasite eliminates within 1 hour without irritation.

**Cattle, buffaloes, cow, sheep & goats:** 1 gm 25-50 kg body weight.

**Packing:-**

5 gm Sachet, 100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## پریمسول 50

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** ہر گرام پاؤڈر

لیو امیسول ہائیڈروکلورائیڈ ..... 500.00 ملی گرام۔

**علامات:**

انڈام انضمام اور پھیپھڑوں کے کرموں، اسکرپیڈ یا گیلانی، ہٹیرکس گیلینیہ م اور فاول آئی ورم کے خاتمے کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (ذریعہ پینے کا پانی)۔

پریمیسول (لیو امیسول) پاؤڈر 36 سے 48 ملی گرام فی کلو گرام وزن کیلئے۔

مرغیاں: 1 گرام 2 سے 3 لیٹر پینے کے پانی میں 12 گھنٹے کے اندر چلائیں۔

فاول آئی ورم: پریمیسول (لیو امیسول) 10% فیصد سلوشن بنا کر آنکھوں میں قطرے ڈالیں، کرم محفوظ طریقے سے ختم ہو جائے گا۔

مویشی، گائے، بھینس، بھیر، بکری: 1 گرام 25 سے 50 کلو گرام زندہ وزن کیلئے۔

**پیکنگ:**

5 گرام ساٹھی، 100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Zoben 20

water soluble granules

**Composition:-** Each gram contains:-

Albendazole ---- 200 mg.

**Indications:-**

**Cattle, Sheep/ goat:-** Nematodes of Stomach/ Intestine, Lung worm Tape worm & Liver fluke, their immature/ mature Larval stages eggs & adult forms.

**Poultry:-** Control of the egg larvae and adult form of Roundworm, Tapeworm, Whipworm and Mansonia.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Control of Roundworm, Tapeworm, Whip worm & Mansonia:**

Poultry: 5 gm / 100 kg of body weight.

*Dosage can be adjusted as per body weight, worm load and severity of the disease.*

**Packing:-**

5 gm x50

50 gm x50

100 gm, 1000 gm,



# زوبن 20 گرینولز

پانی میں حل پذیر گرینولز

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر

البنڈازول ..... 200 ملی گرام۔

**علامات:**

معدہ، آنتوں (گول کرم) اور پھیپھڑوں کے کرم (ڈیکٹوئیکس اقسام)، جگر کے کرم، ٹیپ کرم (سراور جسے) اور ان کے انڈے۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کیلئے۔)

مرغیوں میں گول کرم ٹیپ کرم، وہیپ کرم اور منسونیا: 5 گرام 100 کلو گرام وزن کیلئے۔  
نوٹ: خوراک میں کئی بیشی وزن اور کرموں و بیماری کی شدت کے مطابق کی جاسکتی ہے۔

**پیکنگ:**

5 گرام x 50 ماسے،

50 گرام x 50 ماسے،

100 گرام، 1000 گرام۔

# Bencidall

oral drench

**Composition:-** Each 100 ml contains:

Albendazole ---- 12.5 gm

**Indication:-**

To eliminate & control stomach and intestinal worms (Round, tape worm) Lung worms flukes (Fasciola Species) their larva & adult forms and their eggs.

**Dosage and Administration:-** (For oral use only)

7.5 - 15 mg per kg body weight.

Poultry: 10 mg per kg body weight.

Worms dose (Round, Tape worms) & Lung worms:

5 ml per 100 kg body weight.

Resistant sensitive worms & Flukes (Fasciola Species) dose:

10 ml per 100 kg body weight.

**Withdrawal Period:-**

Milk: 3 days, Meat: 7-10 days.

**Packing:-**

30 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml.



## بین سڈ آل

اورل ڈرنج

**اجزاء:** فی 100 ملی لیٹر ڈرنج

البنڈازول ..... 12.5 گرام

**علامات:**

پیٹ، آنتوں کے کرم (گول، فیٹیہ نما)، لنگ ورم، فلوک (فیٹیولا اقسام) انکی لارول، بالغ اقسام اور انڈوں کے کنٹرول و خاتمہ کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کیلئے۔)

5.7 سے 15 ملی گرام فی کلو گرام وزن کیلئے۔

کرموں کی خوراک (گول، فیٹیہ نما) اور لنگ ورم: 5 ملی لیٹر فی 100 کلو گرام وزن کیلئے۔  
حساس قوت مدافعت رکھنے والے کرم فلوک (فیٹیولا اقسام) 10 ملی لیٹر فی 100 کلو گرام وزن کیلئے۔  
مرغیوں میں: 10 ملی گرام فی کلو گرام وزن کیلئے۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت 7 سے 10 دن، دودھ: 3 دن۔

**پیکنگ:**

30 ملی لیٹر، 100 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر

# Piprex 51

## Oral Solution

**Composition:-** Each 5 ml contains  
Piperazine citrate ---- 02.550 gm.

### Indication:-

Piprex 51 oral solution is indicated for the prevention and treatment of roundworms (*Ascaridia spp.*), Pin worms and thread worms.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Poultry and other Birds:** (22-32 mg/ adult bird)

Piprex 51 oral solution 1.5 ml per 10 kg body weight or  
15 ml per 100 kg body Weight. In drinking water for two days.

Note: 1 liter for 2500-3000 adult birds.

**Cattle, Horses, Sheep & Goat:-** (110 mg Piperazine per kg B.W.)

PIPREX 51 oral solution 5 ml per 10 kg body weight or  
50 ml per 100 kg body weight in drinking water for two days.

### Withdrawal Time:-

Milk: 2 days, Meat: 5 days.

### Packing:-

100 ml, 500 ml, 1000 ml.



# پیپرکس

اورل سلوشن

اجزاء: فی 5 ملی لیٹر:

پیرازین سائی ٹریٹ ..... 02.550 گرام

## علامات:

پیپرکس 51 اورل سلوشن بطور تحفظ اور علاج: گول کرم (اسکیئر پیڈ اقسام)، پن کرم (چھوٹے) اور تھریڈ کرموں کے خاتمہ کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کیلئے۔)

مرغیاں اور پالتو پرندے:- (22 سے 32 ملی گرام فی بالغ برڈ)

پیپرکس 51 اورل سلوشن 1.5 ملی لیٹر فی 10 کلو گرام وزن کے لیے۔ یا

15 ملی لیٹر فی 100 کلو گرام وزن کے لیے پینے کے پانی میں دو روز تک پلائیں۔

نوٹ: 1 لیٹر 2500 سے 3000 بالغ برڈز کے لیے۔

مویشی، گھوڑے، بھیڑ اور بکری وغیرہ:-

(110 ملی گرام پیپرکس 51 فی کلو گرام وزن کے لیے)

پیپرکس 51 اورل سلوشن 5 ملی لیٹر فی 10 کلو گرام وزن کے لیے۔ یا

50 ملی لیٹر فی 100 کلو گرام وزن کے لیے پینے کے پانی میں دو روز تک پلائیں۔

## ادویاتی احتیاط:

دودھ 2 روز، گوشت 5 روز۔

## پیکنگ:

100 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر

# Pri-ox

## Oral Drench

**Composition:-** Each 5 ml contains;

Oxfendazole ---- 113.250mg.

### Indications:-

Pri-ox is indicated for the treatment of Round worms, tape worms, Lung worms in their immature and larval stages. and also indicated for adult liver flukes.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Poultry:-** 1ml per 2 kg body weight.

**Cattle, Buffalo, Camel:-** 1ml for 8 kg live weight.

**Horses:-** 10ml per 22 kg body weight.

**Sheep/ Goat:-** 1ml for 5 kg body weight.

*Dosage can be adjusted as per body weight, worm load and severity of the disease.*

### Packing:-

100 ml, 500ml, 1000 ml.



## پری اوکس

اورل ڈرنج

**اجزاء:** ہر 5 ملی لیٹر

اوکسینڈازول 113.250 ملی گرام

### علامات:

پری-اوکس اورل ڈرنج مویشی (گائے، بھینس)، اونٹ، گھوڑے، بھیر، بکری اور مرغیوں میں پیٹ، آنتوں اور پھیپھڑوں کے گول کرم، ٹیپ کرم (سراور حصے) اور ان کی نابالغ، بالغ اقسام وائٹوؤں کے خاتمہ اور بھیروں میں بالغ جگر کے کرموں کے خلاف موثر دوا ہے۔

### خوراک و استعمال:

مرغیاں:- 1 ملی لیٹر 2 کلو گرام وزن کھینے۔

مویشی (گائے، بھینس)، اونٹ:- 1 ملی لیٹر 8 کلو گرام وزن کھینے۔

گھوڑے:- 10 ملی لیٹر 22 کلو گرام وزن کھینے۔

بھیر، بکری:- 1 ملی لیٹر 5 کلو گرام وزن کھینے۔

نوٹ: خوراک میں کئی بیشی وزن اور کرموں کی شدت کے مطابق کی جاسکتی ہے۔

### پیکنگ:

100 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر

# Metabolites/ Vitamins/ Electrolytes & Liver Tonic/ Nutritional Supplements



# Ceprix 300

water soluble powder

**Composition:-** Each g contains:

Vitamin C (L-Ascorbic Acid) --- 300 mg

**Indications:-**

Stress, fatigue, leg weakness, to improve egg shell quantity, to improve immunity against diseases.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry (All ages), other birds, Cattle, Horses, Sheep & Goat:**

1 gm Ceprix 300 powder in 2-3 litres of water 3-5 days.

**In Feed:** 100 gm Ceprix 300 powder per 100 kg feed.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



# سی پرکس 300

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر:

وٹامن سی (ایل اسکوربک ایسڈ) ..... 300 ملی گرام

**علامات:-**

سی پرکس پاؤڈر سٹریس، خستگی، پیراں کی کمزوری، خلیوں کی وجہ بننے والی بیماریاں، ویکسی نیشن، نقل و حرکت اور موسمی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے قوت معدا فعت میں کمی کو دور کرنے کیلئے۔

**خوراک و استعمال:-** (ہڈریو پینے کا پانی)۔

مرغیاں (ہر عمر) دو پندرہ سے، مویشی، گھوڑے، بھیڑ، بکری وغیرہ میں:-

1 گرام 2 سے 3 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن۔

فیڈ: 100 گرام فی 100 کلو فیڈ۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Farvisol Plus

Water Soluble Powder

**Dietary Supplement**

## Composition:-

Active substances per gm powder:

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 20,000 IU vitamin A         | 0.5 mg folic acid               |
| 5,000 IU vitamin D3         | 2.84 mg vitamin K3              |
| 10 mg vitamin E             | 10 mg methionine                |
| 25 mg vitamin C             | 5 mg lysine hydrochloride       |
| 2 mg vitamin B1             | 50 mg sodium sulphate anhydrate |
| 4.6 mg vitamin B2           | 30 mg potassium chloride        |
| 2.5 mg vitamin B6           | 15 mg manganese sulphate        |
| 25 µg vitamin B12           | 15 mg zinc sulphate monohydrate |
| 11 µg biotin                | 2 mg copper sulphate            |
| 25 mg nicotinamide          | 15 mg ferrous sulphate          |
| 7.5 mg calcium Pantothenate |                                 |

## Target species:-

Cattle, calves, poultry, horses, foals, sheep, lamb, goat, kids.

## Indications:-

Prevention or treatment of vitamin deficiencies in farm animals, stress (caused by vaccination, diseases, transport, high humidity, high temperatures, extreme temperature changes) and improper feeding.

## Dosage and administration:-

Orally administration via drinking water. Always make a solution in approximately 10 liters of drinking water.

Medicated water should be used within 24 hours.

1 kg Farvisol plus per 2000 - 4000 litres of drinking water Poultry;

*The dosage can be adjusted according the water intake.*

5 gm per animal Cattle/horses:

2 gm per animal Calves, Foal:

1 gm per animal Sheep/goats:

Lamb/Kids: 0.5 gm per animal

## Withdrawal time:-

None

## Packing:-

1 kg.

## فاروی سول پلس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

### غذائی سپلیمنٹ

#### اجزاء: فی گرام پاؤڈر:

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 20,000 آئی یو وٹامن اے        | 0.5 ملی گرام فولک ایسڈ               |
| 5,000 آئی یو وٹامن ڈی ۳       | 2.84 ملی گرام وٹامن کے ۳             |
| 10 ملی گرام وٹامن ای          | 10 ملی گرام میتھونین                 |
| 25 ملی گرام وٹامن سی          | 5 ملی گرام لائیسلین بائیڈروکلورائیڈ  |
| 2 ملی گرام وٹامن بی ۱۲        | 50 ملی گرام سوڈیم سلفیٹ این بائیڈریٹ |
| 4.6 ملی گرام وٹامن بی ۶       | 30 ملی گرام پوٹاشیم کلورائیڈ         |
| 2.5 ملی گرام وٹامن بی ۲       | 15 ملی گرام میگنیشیم سلفیٹ           |
| 25 مائیکو گرام وٹامن بی ۱۲    | 2 ملی گرام زنک سلفیٹ مونو بائیڈریٹ   |
| 11 مائیکو گرام بائیوٹین       | 2 ملی گرام کاپر سلفیٹ                |
| 25 ملی گرام نیکوٹینامائیڈ     | 15 ملی گرام                          |
| 7.5 ملی گرام پیکٹین پینٹھوئیٹ |                                      |

#### استعمال:

مویشی، بچھرے، مرغیاں، گھوڑے، بچھیرے، بھیر، لیمب، بکری اور بچھے۔

#### علامات:

## خوراک و طریقہ استعمال: صرف پلانے کیلئے (بذریعہ پانی و فیڈ)

فاروی سول پلس کی تجویز کردہ خوراک پہلے ہمیشہ 10 لیٹر تک پانی میں حل کریں پھر جاری پینے کے پانی میں ملائیں۔

مویشی، گھوڑے: 5 گرام فی جانور

بچھرے، بچھیرے: 2 گرام فی جانور

مرغیاں: 1 کلو گرام فاروی سول پلس فی 2000 سے 4000 لیٹر پینے کے پانی میں۔

بھیر، بکری: 1 گرام فی جانور

لیمب، بکری کے بچھے: 0.5 گرام فی جانور

### ادویاتی احتیاط:

انڈے و گوشت: کوئی نہیں۔

### احتیاط:

### پیکنگ:

1 کلو گرام۔

# Faraminovit

Water Soluble Powder

## Composition:-

Active substances per gm powder:

|            |             |              |         |
|------------|-------------|--------------|---------|
| Vitamin A  | 10,000 I.U. | Vitamin B6   | 1.5 mg  |
| Vitamin D3 | 1,000 I.U.  | Vitamin C    | 25 mg   |
| Vitamin E  | 10 mg       | Vitamin K3   | 1.5 mg  |
| Vitamin B1 | 2 mg        | Folic Acid   | 500 mcg |
| Vitamin B2 | 4 mg        | Nicotinamide | 20 mg   |
| Calcium    | 10 mg       | Biotin       | 15 mcg  |

Pantothenate .

## Amino Acids:-

|               |          |               |         |
|---------------|----------|---------------|---------|
| Methionine    | 50 mg    | Isoleucine    | 23.6 mg |
| Lysine        | 50 mg    | Leucine       | 35.4 mg |
| Alanine       | 12.96 mg | Phenylalanine | 19 mg   |
| Arginine      | 15.6 mg  | Proline       | 39.2 mg |
| Aspartic acid | 27.8 mg  | Serine        | 24.0 mg |
| Cystine       | 1.9 mg   | Threonine     | 18.6 mg |
| Glutamic acid | 85 mg    | Tryptophane   | 6.4 mg  |
| Glycine       | 8 mg     | Valine        | 27.4 mg |
| Histidine     | 11.8 mg  |               |         |

## Target species:-

Cattle, calves, poultry, horses, foals, sheep, goats, kids

## Indications:-

Faraminovit is a balanced combination of essential vitamins and free amino acids. Indicated as a powerful aid in cases of stress conditions and/or improper feed, especially as far as quality of the protein concerns.

## Dosage & Administration:-

Oral administration via the drinking water. Always make a solution in approximately 10 litres of drinking water.

Medicated water should be used within 12 hours.

**Poultry:-** 30-60 gm per 100 litre drinking water, during 4 - 8 consecutive days.

*The dosage can be adjusted according to water intake.*

**Cattle, Horses:-** 6 gm per animal

**Calves, Foals:-** 3 gm per animal

**Sheep, goat:-** 1 gm per animal

**Kids:-** 0.5 gm per animal

## Withdrawal Time:-

None

## Packing:-

1 kg.



## فارامینوٹ

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

فارامینوٹ طاقتور حیاتین اور ایمینو ایڈز کا مثالی غذائی مرکب ہے۔ جس کا استعمال مویشی، گائے، بھینس، گھوڑوں، بچھڑا، بچھیرا، اور مرغیوں میں ان اجزاء کی کمی کو فوری بحال کر کے نشوونما اور پیداواری صلاحیت کو پائیدار بناتا ہے۔ نیز قوت مدافعت میں اضافہ کا ضامن ہے۔

### اجزاء: فی گرام پاؤڈر:

وٹامن اے ۱۰،۰۰۰ آئی یو، وٹامن ڈی ۳،۰۰۰ آئی یو، وٹامن ای ۱۰ ملی گرام، وٹامن بی ۲۱ ملی گرام، وٹامن بی ۲ ۴۰ ملی گرام، بیکسٹیم پیٹنٹوٹ ۱۰ ملی گرام، وٹامن بی ۱۲ ۵۶ ملی گرام، وٹامن سی ۲۵ ملی گرام، وٹامن کے ۳ ۵۰ ملی گرام، فولک ایسڈ ۵۰۰ مائیکرو گرام، نیکوٹینامائیڈ ۳۰ ملی گرام، بایوٹین ۱۵ مائیکرو گرام، میتھوین ۵۰ ملی گرام، لائیسن پائیدر وکٹوریٹ ۵۰ ملی گرام، ایلائن ۱۲،۹۶ ملی گرام، اریسین ۱۵،۶ ملی گرام، اسپارٹک ایسڈ ۸،۲ ملی گرام، سسٹین ۹،۱۱ ملی گرام، گلوٹامک ایسڈ ۸۵ ملی گرام، گلائسین ۸ ملی گرام، ہسٹاڈین ۱۱،۸ ملی گرام، آکسولوسین ۲۳،۶ ملی گرام، لیوسین ۳۳،۵ ملی گرام، فیٹائل ایلائن ۱۹ ملی گرام، پرولین ۳۹،۲ ملی گرام، سرین ۲۴ ملی گرام، تھیرونین ۶،۱۸ ملی گرام، ٹریپتوفین ۶،۴ ملی گرام، وٹیلین ۴،۲ ملی گرام

### علامات:

حیاتین و ایمینو ایڈز کی کمی واقع ہونا دباؤ Stress کا آجانا مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے نقل و حرکت، درجہ حرارت میں کمی بیشی، موسم کی شدت، چونچ کا نانا ہوا میں نمی کا بڑھنا بیماری وغیرہ۔ ناقص فیڈ، پیداواری کمزوری، جوش و انداز کی پیداوار میں کمی، نشوونما میں رکاوٹ، خونی عیض، کرم، بیکٹیریا اور وائرس سے انفیکشنز کے علاج کے بعد۔

### خوراک و استعمال: (بزرگ پینے والی پانی)

مویشی و گھوڑے: 6 گرام فی جانور

بچھڑا و بچھیرا: 3 گرام فی جانور

بھیر بھیری: 1 گرام فی جانور

مکھن: 5.0 گرام فی جانور

فارامینوٹ 1 گرام سے 10 گرام تک روزانہ دیا جاسکتا ہے۔ خوراک کی کمی بیشی ضرورت کے مطابق کریں۔

بچوں و مرغیوں میں: 1 گرام سے 4 لیٹر پینے کے پانی میں ملا کر پار سے آنچر و تک پلائیں۔ خوراک کی کمی بیشی ضرورت کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ نیز حفظہ ماہی و صحت مند فارمنگ کے لئے بچوں کی آمد پر پہلی مرتبہ تین روز گاتا پھر چھٹے، نویں، پندرہویں اور پچیسویں روز دے کر عمدہ نتائج حاصل کریں۔

فیڈ: ایک گرام فارامینوٹ ایک کلو گرام فیڈ میں ملا کر دیں۔

### ادویاتی احتیاط: کوئی نہیں۔

### احتیاط:

فارامینوٹ کی تجویز کردہ خوراک پہلے ہمیشہ 10 لیٹر تک پانی میں حل کریں پھر جاری پینے کے پانی میں ملا لیں۔

### پیکنگ:

1 کلو گرام۔

# Metavit Super

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each kg contains:

Vitamin A 20,000,000 IU, Vitamin D3 5,000,000 IU, Vitamin E 5500 IU, Vitamin K3 3000 mg, Vitamin B1 2000 mg, Vitamin B2 3500 mg, Niacin 20,000 mg, Pantothenic acid 6600 mg, Vitamin B 6 3600 mg, Vitamin B12 20 mg, vitamin C 20,000 mg, Folic acid 400 mg, DL-Methionine 10,000 mg.

**Indications:-**

As a dietary supplement / treatment of essential vitamins deficient diseases or weaknesses in poultry, turkeys, other exotic birds, calves, foals sheep goat, kids, other lives-stock during stress, sickness, parasitism and avitaminosis.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**During Stress, Disease Periods:**

*Poultry (All Ages)/ Exotic birds:* 25g in each 100 liters of water.

*Calves, Foals, sheep, goat, kids:* ½-1 gm per 10 kg live weight. in water, milk or milk replacer.

**Deficiency diseases (Avitaminosis):**

*Poultry (All Ages)/ Exotic birds:* 50 g in each 100 Liters of water. Use continuously as per flock conditions.

*Calves, Foals, sheep, goat, kids:* 1-2 gm per 10 kg live weight, give as per need of the animal.

**Packing:-**

100 gm, 1 Kg, 5 Kg.



## میٹاویٹ سپر

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** ہر کلوگرام پاؤڈر

وٹامن اے 20,000,000 آئی یو، وٹامن ڈی 5,000,000 آئی یو، وٹامن ای 5,500 آئی یو، وٹامن کے 3000 ملی گرام، وٹامن بی 1 2,000 ملی گرام، وٹامن بی 2 3,500 ملی گرام، نیا سین 20,000 ملی گرام، پینٹو تھینک ایسڈ 6,600 ملی گرام، وٹامن بی 6 3,600 ملی گرام، وٹامن بی 12 20 ملی گرام، وٹامن سی 20,000 ملی گرام، فولک ایسڈ 400 ملی گرام، ڈی ایل میتھونین 10,000 ملی گرام۔

**علامات:**

مرغیوں اور پالتو جانوروں میں بطور غذائی سپلیمنٹ، وٹامنز کی کمی کو دور کرنے، بیماریوں کے خلاف قوت معذافت بڑھانے، وزن بڑھانے کیلئے انڈوں کی شرح پیداوار اور ان کے چھلکوں کی مضبوطی کیلئے ذودا اثر اور مفید ہے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

سڑیس اور بیماری کی حالتیں:

مرغیاں (تمام عمر) اور پالتو پرندے: 25 گرام 100 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر فلوک کی ضرورت کے مطابق۔

مویشی، بچھڑا، بچھیرا، بھیریں وغیرہ: ½ سے 1 گرام پاؤڈر 10 کلوگرام وزن کیلئے۔

وٹامنز کی کمی سے بیماریاں (اے وائلو مینوسسز):

مرغیاں (تمام عمر) اور پالتو پرندے: 50 گرام 100 لیٹر پینے کے پانی میں متواتر فلوک کی ضرورت کے مطابق۔

مویشی، بچھڑا، بچھیرا، بھیریں وغیرہ: 1 سے 2 گرام پاؤڈر 10 کلوگرام وزن کیلئے۔

ایک یا دو خوراکیوں میں روزانہ پینے کے پانی یا دودھ یا متبادل دودھ میں ملا کر دیں۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 1 کلوگرام، 5 کلوگرام۔

# Pri-Adek

Water Soluble Powder

**Composition:-** Each gm contains:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Vitamin A                             | 50,000 IU |
| Vitamin D3                            | 5,000 IU  |
| Vitamin E (Alpha Tocopheryl)          | 15,000 mg |
| Vitamin K3 (Mendiol sodium phosphate) | 12,500 mg |

**Indications:-**

Cattle, Calves, Foals nutrition supplement, Vitamin deficiency, to increase Immunity, growth, appetite & weight gain, protein deficiency due to worms & to increase egg production in poultry.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry & exotic birds (all ages):** 1 gm in 8—10 liter of DW. for 7 days.

**Calf, Foal, Sheep, Goat, etc:** 4 gm per animal for 7 days.

**Milking Cow & Buffalo:** 8 gm per animal for 7 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## پری ایڈک

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| وٹامن اے                             | 50,000 آئی یو   |
| وٹامن ڈی 3                           | 5,000 آئی یو    |
| وٹامن ای (ایلفا ٹوکوفرل ایسیٹیٹ)     | 15,000 ملی گرام |
| وٹامن کے 3 (مینڈاڈائول سوڈیم فاسفیٹ) | 12,500 ملی گرام |

**علامات:-**

مرغیوں اور جانوروں میں غذائی معاون، وٹامنز کی کمی کو دور کرنے، بوقت معدافعت میں اضافے، نشوونما، بھوک اور وزن بڑھانے، طفیلی کرموں کی وجہ سے حیاتین میں کمی اور انڈوں کی پیداوار میں اضافے کیلئے۔

**خوراک و استعمال:-** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں اور پالتو ہندسے:- 1 گرام 8 سے 10 لیٹر پینے کے پانی میں 7 دن۔

بچھڑا، بچھیرا، بھیر اور بکری:- 4 گرام فی جانور روزانہ 7 دن۔

دودھ دینے والی گائے، بھینس:- 8 گرام فی جانور روزانہ 7 دن

**پیکنگ:-**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Hepa-Pri

Oral Solution

**Composition:-** Each 100 ml contains;

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| DL-Methionine              | 5 gm  |
| L-Lysine monohydrochloride | 10 gm |
| Choline Chloride           | 19 gm |
| Vitamin B12                | 1 mg  |
| Sorbitol                   | 10 gm |

**Indications:-**

In the prevention and treatment of fatty liver, Live Pathologies, reduces harmful effects of mycotoxin, overfeeding, stress; birds fed with very energetic feeds or contaminated by fungus, presence of mycotoxins, after use of strong medications, (coccidiostats), caged birds (sedentary), moulting, stress sudden deaths in broilers. Hepato-protective in periods of strong growth or in laying peaks.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Poultry (All ages):-** 1 ml per 1-2 liters of DW. for 5 consecutive days.

**Young/ Adult cattle:-** 25-50 ml per animal daily.

**Sheep/ Goats:-** 10 ml per animal daily.

**Dogs & Cats:-** 2-5 ml per animal daily

Repeat Hepa-pri oral solution until disappearance of symptoms.

**Packing:-**

60 ml, 120 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter.



## ھیپا پری

اورل سلوشن

**اجزاء:** فی 100 ملی لیٹر

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ڈی ایل۔ میتھائیونین              | 5 گرام     |
| ایل۔ لائیسن مونو ہائیڈروکلورائیڈ | 10 گرام    |
| کولین کلورائیڈ                   | 19 گرام    |
| وٹامن بی 12                      | 1 ملی گرام |
| ساربیٹول                         | 10 گرام    |

**علامات:**

فیٹی لیور جگر کی میتابولک بیماریاں، مائیکوٹوکسن کے مضر اثرات ختم کرنے کیلئے۔ خوراک کی زیادتی، ناقص خوراک، فید میں فحاشی اور مائیکوٹوکسن کا پیدا ہونا، ایٹھی بیکٹیریل اور ایٹھی کوکسیڈیل ادویات کا متواتر استعمال، مولنگ، سٹریس، برائے اثر کی اچانک اموات، لیسر میں انڈوں کی بڑھوتری اور جگر کے افعال کی درستی کے لیے۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کیلئے۔)

مرغیاں (ہر عمر): 1 ملی لیٹر 1 سے 2 لیٹر پینے کے پانی میں مسلسل 5 روز کے لیے۔

مویشی (بالغ، نابالغ): 25 سے 50 ملی لیٹر فی جانور روزانہ۔

بھیر، بکری: 10 ملی لیٹر فی جانور روزانہ۔

کتے، بلیاں: 2 سے 5 ملی لیٹر فی جانور روزانہ۔

ہیپا پری اورل سلوشن کا استعمال بیماری کے اثرات دور ہونے تک جاری رکھیں۔

دوا ملا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کریں۔

**پیکنگ:**

60 ملی لیٹر، 120 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1 لیٹر، 5 لیٹر۔

# Prion

Oral re-hydrating solution

**Composition:-** Each 5 ml contains:-

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Cyanocobalamin                 | 0.125 mg |
| Sodium chloride                | 600 mg   |
| Potassium chloride             | 40 mg    |
| Calcium chloride Hexahydrate   | 10 mg    |
| Magnesium chloride Hexahydrate | 20 mg    |
| Sodium Lactate                 | 213.5 mg |
| Sorbitol excipient             | 350 mg   |

**Indications:-**

De-hydration due to sudden variation of temperature/ transportation/ over fatigue/ stress, Toxicosis, diarrhoea, acidosis, with energizing effect.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

Prion oral re-hydrating solution 35 ml per litre of water in the drinking pens of the animals. In to 2-3 doses as per requirement.

**Poultry, Other Birds:-** 1ml in 1-2 liters of water.

**Cattle, Horses:-** 5-15 liters of prepared solution as per capacity of drinking 2-3 administration daily.

**Calf, foals, sheep, goats etc:-** 2-5 liter of prepared solution 2-3 administration daily.

**Packing:-**

100 ml, 500 ml, 1000 ml.



## پری اوئن

اورل ری ہائیڈریٹنگ سلوشن

**اجزاء:** فی 5 ملی لیٹر

|                                |                |          |                |
|--------------------------------|----------------|----------|----------------|
| سائینوکوبالامین                | 0.125 ملی گرام | سوربیتول | 350 ملی گرام   |
| پوٹاشیم کلورائیڈ               | 40 ملی گرام    | سوربیتول | 213.5 ملی گرام |
| کلیشیم کلورائیڈ ہیکسا ہائیڈریٹ | 10 ملی گرام    | سوربیتول | 213.5 ملی گرام |
| سوربیتول                       | 350 ملی گرام   |          |                |

**علامات:**

پانی اور نمکیات کی کمی، سٹریس، محنت مزدوری، دوڑ یا کھیلوں میں (گھوڑے) استعمال ہونے والے جانور، وبائی یا غیر وبائی ڈائریا کے اثرات کو ختم کرنے اور ٹاکسیکوسس وغیرہ کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کیلئے۔)

پری اوئن اورل سلوشن 35 ملی لیٹر فی لیٹر پینے کے پانی میں ملا کر مندرجہ ذیل طریقہ سے پلائیں۔

مرغیاں اور پالتو پرندے: 1 ملی لیٹر سے 2 لیٹر پانی میں۔

مویشی، گھوڑے: 5 سے 15 لیٹر دواملا پانی دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔

بچھڑے، چکھیرے، بھیرے، بکری: 2 سے 5 لیٹر دواملا پانی دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔

**پیکنگ:**

100 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر۔

# Pri-Tolevit + Se

Oral Liquid

**Composition:-** Each 100 ml contains

Vitamin E ----- 10 gm.

Sodium Selenite ----- 50 mg.

**Indications:-**

Pri-tolevit + Se is indicated for low fertility, & hatchability, immune suppression, Muscular dystrophy, Fatigue, and deficiency of Vitamin E and selenium.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Poultry, other animals:** 1ml in 4 Lit of drinking water.

Medicated water should be used within 24 hours.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Egg: non

**Packing:-**

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.



# پری ٹول وٹ پلس ایس ای

اورل لیکویڈ

**اجزاء:** ہر 100 ملی لیٹر۔

وٹامن ای ..... 10 گرام

سڈیم سلیکائیٹ ..... 50 ملی گرام

**علامات:**

پری ٹول وٹ کم تولیدی صلاحیت اور شرح تولید، قوت مدافعت میں کمی، مسکولر ڈسٹروفی، تھکاوٹ اور وٹامن ای اور سلیکائیٹ کی کمی میں۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کے لئے۔)

مرغیوں اور دوسرے جانوروں میں: { 1 ملی لیٹر 4 لیٹر پینے کے پانی میں۔ یا 100 ملی لیٹر فی بوری فیڈ میں۔  
دوا ملا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کروائیں۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت وانڈے: کوئی نہیں

**پیکنگ:**

100 ملی لیٹر، 250 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر۔

# Tolfos plus

oral solution

**Composition:-** Each 5 ml contains;

Toldimfos sodium ----- 500.00 mg

Cyanocobalamin ----- 150 µg.

**Indications:-**

Tolfos Plus is indicated to Stimulate metabolism, enhance immunity, improve F.C.R, Strengthen egg shell increase productivity, elevate stress conditions, and reduce mortality.

**Dosage & Administration:-** (for oral use only.)

**Broiler:-** 0.3 ml per bird or 1.5 ml per liter of drinking water 5 days consecutively.

**Layer/Breeder:-** 0.5ml per bird or 2.5 ml per liters of drinking water 2-7 days consecutively.

**Horse & Large Animal:-** 15 ml per 50 kg body weight.

**Small Animal:-** 7.5 ml per 50 kg body weight.

*Dosage can be adjusted as per need.*

*Medicated water should be administered in one go.*

**Packing:-**

100 ml, 500 ml, 1000 ml.



# ٹالفاس پلس

اورل سلوشن

**اجزاء:** 5 ملی لیٹر

ٹولڈیم فاس سوڈیم ..... 500.00 ملی گرام

سائیٹوکوبالمن ..... 150 مائیکرو گرام

**علامات:**

ایک طاقتور میٹابولک ہے جو اینزائم کی کارکردگی کے عمل کو جسم میں بڑھاتا ہے۔ یہ نوزائیدہ جانوروں میں کمزوری، فالج، وزن میں کمی، ناقص نشوونما اور ہڈیوں کے بھرنے سے تھکن میں مفید ہے۔

**خوراک و استعمال:** (صرف پلانے کے لئے۔)

برائیکلر:- 0.3 ملی لیٹر فی برڈ۔ یا 1.5 ملی لیٹر فی لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن۔

لیئر/بریڈر:- 0.5 ملی لیٹر فی برڈ۔ یا 2.5 ملی لیٹر فی لیٹر پینے کے پانی میں 2 سے 7 دن۔

گھوڑے و بڑے جانور:- 15 ملی لیٹر فی 50 کلو گرام وزن۔

چھوٹے جانور:- 7.5 ملی لیٹر فی 50 کلو گرام وزن۔

نوٹ: خوراک میں کمی جی ضرورت کے مطابق کریں۔ دو املا پانی ایک دورانیہ میں پلائیں۔

**پیکنگ:**

100 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر۔

# Analgesics/ Anti-Pyretic/ Anti-Inflam- matory



# Gesix C

Water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

Acetylsalicylic acid (Asprin) ---- 67.00 mg

Vitamin C (L-Ascorbic acid) ---- 207.00 mg

**Indications:-**

Acetylsalicylic acid can be used as potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic. Vitamin C is recommended as an potent anti-stress remedy, to improve immunity in parasitic and infectious diseases, transport, vaccination, debeaking, sudden change of climate, poor feeding and decreased productivity.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry & other birds:** 1g / 2 litre of drinking water for 1-2 days.

**Cattle, Calves, Horses, Foals, Sheep & Goat:** 1g / 25- 50 kg body weight for 1-2 days.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## جیسکس۔سی

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:-** فی گرام پاؤڈر

ایسٹیل سلیسکک ایسڈ (اسپرین) ..... 67.00 ملی گرام

وٹامن سی (اسکوربک ایسڈ) ..... 207.00 ملی گرام

**علامات:-**

جیسکس سی شدید موسمی استار چودھا (سوزش، بخار، درد کی کیفیت) اعصابی دباؤ، قوت مدافعت میں کمی، ویکسی نیشن، چوچ کا کاٹنا، وائرل یا بیکٹریل بیماریاں اور پیداواری صلاحیتوں میں کمی کو پورا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔


**خوراک و استعمال:-** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں (ہر عمر) اور دوسرے پرندے: 1 گرام 2 لیٹر پینے کے پانی میں 1 سے 2 روز۔  
مویشی، بچھڑے، گھوڑے، بکری، بکری، بکری: 1 گرام 25 سے 50 کلو گرام وزن کے لئے 1 سے 2 روز۔

**پیکنگ:-**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Flusher/ Diuretics



# Filtrax

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

Hexamethylene tetra-mine - 955.00 mg.

Vitamin B2 -----10.00 mg.

Calcium pantothenate -----5.00 mg.

Nicotinamide ----- 25.00 mg.

**Indications:-**

To detoxify feed toxins, bacterial, viral, parasitic, diseases affects, dehydration, water belly, kidney flusher, to improve immunity.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:** 1gm Filtrax powder in 1-2 Litres of water 3-5 days.

for better vaccination Titer, use Filtrax powder 12 hour before vaccination.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



## فلٹریکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر:

ہیکسامتھیلین ٹیٹرا امین ..... 955.00 ملی گرام

وٹامن بی ۲ (سوڈیم فاسفیٹ) ..... 10.000 ملی گرام

کیمیشیم پیٹنٹوٹھینیت ..... 05.000 ملی گرام

نیکوٹینامائیڈ ..... 25.000 ملی گرام

**علامات:**

خود اک کے زہریلے مادے ختم کرنے کیلئے، بیکٹریا، وائرل اور کرموں کے اثرات کو زائل کرنے کیلئے، ڈی ہائیڈریشن، پیٹ میں پانی کا بھرنا اور قوت مدافعت میں اضافے کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (بذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیاں: 1 گرام پاؤڈر 1 سے 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک۔

دیکھین کے بہتر نتائج کیلئے 12 گھنٹے قبل فلٹریکس استعمال کریں۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

# Urix

water soluble powder

**Composition:-** Each gm contains:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Methenamine                                        | 950.00 mg |
| Vitamin B <sub>1</sub> (Thiamine hydrochloride)    | 08.000 mg |
| Vitamin B <sub>2</sub> (Sodium phosphate)          | 10.000 mg |
| Vitamin K <sub>3</sub> (Menadiol sodium phosphate) | 02.000 mg |

**Indications:-**

For diuretic effect in cases of oedema, Ascites, Hydropericardium syndrome, liver/ kidneys pathologies, toxins feed/ continuous use of Antibacterials/ Anticoccidials.

**Dosage & Administration:-** (via drinking water.)

**Poultry:-** 1 gm in 1-2 litres of D.W in 4-8 hourly daily 1-2 days.

**Cattle, Equine:-** 1 gm per 10 kg body weight for 7 days.

**Withdrawal Time:-**

Meat & Eggs: None.

**Packing:-**

100 gm, 500 gm, 1000 gm.



# یورکس

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

**اجزاء:** فی گرام پاؤڈر:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| میتھینامین بی پی                               | 950.00 ملی گرام |
| وٹامن بی <sub>1</sub> (تھامین ہائیڈروکلورائیڈ) | 08.000 ملی گرام |
| وٹامن بی <sub>2</sub> (سڈیم فاسفیٹ)            | 10.000 ملی گرام |
| وٹامن کے 3 (میناڈائی اول سوڈیم فاسفیٹ)         | 02.000 ملی گرام |

**علامات:**

گردہ، مثانہ کے افعال کی درستگی سوزش اور سڑکس، نفراٹس، سیدھا ٹیس، آب قلب، اسائیز اور اڈیم میں گردوں کی صفائی۔ ایٹنی بائیونک یا دوسری ادویات کی زیادتی سے پیدا شدہ زہریلے مواد، یورٹکس کو جسم سے خارج کرنے کیلئے۔

**خوراک و استعمال:** (ہذریعہ پینے کا پانی)۔

مرغیوں میں: 1 گرام پاؤڈر 1 سے 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔  
مویشی و ایکوان: 1 گرام پاؤڈر 10 کلو گرام وزن کیلئے متواتر 7 دن۔

**ادویاتی احتیاط:**

گوشت، انڈے: ضرورت نہیں۔

**پیکنگ:**

100 گرام، 500 گرام، 1000 گرام۔

## Poultry Vaccination Schedule

### A) Layers

| Vaccine                                    | Age              | Route of Administration       |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Marek's disease                            | 1 day            | Intransal/ Intra ocular       |
| Ranikhet disease (F-strain)                | 4-10 days        | Intra ocular / Intra nasal    |
| Gumboro disease                            | 18-21 days       | Intra ocular / Drinking water |
| Infectious bronchitis                      | 24-48 days       | Intra ocular / Drinking water |
| Ranikhet disease (Booster)                 | 5 – 6 weeks      | Intra ocular/ Drinking water  |
| Ranikhet (R2B strain)                      | 8-9 weeks        | Subcutaneous                  |
| Fowl pox                                   | 10-11 weeks      | Scratching                    |
| Infectious bronchitis (booster)            | 14-16 weeks      | Drinking water                |
| Fowl pox (Booster)                         | 16-17 weeks      | Scratching / Intramuscular    |
| Ranikhet disease (Killed)                  | 18-19 weeks      | Intramuscular / Subcutaneous  |
| Ranikhet and Bronchitis (Combined vaccine) | 40 weeks & above | Drinking water                |
| Gumboro disease                            | 45-50 weeks      | Intramuscular / Subcutaneous  |

### B) Broiler

| Vaccine                     | Age        | Route of administration                   |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Marek's disease             | 1 day      | Subcutaneous                              |
| Ranikhet disease (F-strain) | 4-10 days  | Intra ocular / Intra nasal                |
| Gumboro disease             | 18-21 days | Intra ocular / Drinking water             |
| Ranikhet disease (Booster)  | 30-35 days | Intra ocular/ Intra nasal/ Drinking water |

## Poultry Breeds of Pakistan

| Breed Name            | Utility   | Geographic Distribution |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Aseel                 | Sport     | All over Pakistan       |
| Desi                  | Egg, Meat | All over Pakistan       |
| Lyallpur Silver Black | Egg, Meat | UAF                     |
| Naked Neck            | Egg, Meat | All over Pakistan       |

## Scientific Name of Birds

| Common Name        | Scientific Name      |
|--------------------|----------------------|
| Chicken            | Gallus Domesticus    |
| Duck               | Anas Platyrhynchos   |
| Geese              | Anser Anser          |
| Golden Eagle       | Aquila Chary Sactes  |
| Guinea Fowl        | Numida Meleagris     |
| Muscovy            | Canina Maschata      |
| Ostrich            | Struthio camelus     |
| Pea Fowl (Peacock) | Pavo Cristatus       |
| Pigeon             | Columba Livia        |
| Pheasants          | Phasians Colchrices  |
| Quai               | Coturnix spp.        |
| Red Horned Owl     | Bubo Bubo            |
| Turkey             | Meleagris Gallo Povo |

Note:

Handwriting practice lines on page 88. The page contains 10 sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The first set of lines includes a row of numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) for tracing practice.

Note:

Handwriting practice lines on page 05. The page contains 10 sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The first set of lines includes a row of numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) for tracing practice.